

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Obesitas dan Perokok terhadap Kejadian *Post Operative Nausea & Vomiting* (PONV) pada General Anestesi di RSUD Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Didapatkan responden obesitas (>25) sebanyak 10 responden 14.7%, responden perokok pasif 42 responden 61.8%, dan PONV 24 responden 35.3%.
- 2) Adanya pengaruh obesitas terhadap kejadian PONV pada general anestesi dengan $p \text{ value } 0,000 < 0,05$.
- 2) Adanya pengaruh perokok terhadap kejadian PONV pada general anestesi dengan $p \text{ value } 0,942 > 0,05$.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi peneliti

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, masih banyak kekurangan – kekurangan yang didapatkan, saya berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

6.2.2 Bagi peneliti selanjutnya

Selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian mengenai beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi kejadian *Post Operative Nausea And Vomiting* (PONV) dengan General Anestesi, adanya waktu observasi kejadian PONV yang lebih maksimal dan penggunaan lembar observasi kejadian PONV yang lebih beragam.