

ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU *POST SECTIO CAESAREA* ATAS INDIKASI GAGAL INDUKSI OKSITOSIN DENGAN NYERI AKUT DI RUANG ALAMANDA OBGYN RSUD MAJALAYA

**IIS NOVITA RAHMADHANI
211FK01044**

Program Studi DIII Keperawatan, Fakultas Keperawatan
Universitas Bhakti Kencana

ABSTRAK

Latar Belakang: *Sectio caesarea* merupakan suatu tindakan pembedahan untuk mengeluarkan janin melalui insisi di dinding abdomen dan uterus. Angka persalinan dengan metode *Sectio Caesarea* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di Jawa Barat pada tahun 2018 mengalami peningkatan sekitar 15.48%. Hal ini dapat berisiko munculnya masalah keperawatan setelah dilakukan *sectio caesarea*. Masalah yang sering timbul pada post SC yaitu adanya luka pasca pembedahan, yang dapat menimbulkan masalah Nyeri, keadaan nyeri post operasi *sectio caesarea* pada ibu akan menjadi gangguan yang menyebabkan terbatasnya mobilisasi, *bounding attachment* tidak terpenuhi, *activity of daily living* (ADL) terganggu, karena peningkatan intensitas nyeri pada post operasi *sectio caesarea*. Sehingga membutuhkan intervensi keperawatan untuk mengurangi nyeri. **Tujuan:** menggambarkan tentang Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post *Sectio Caesarea* Atas Indikasi Gagal Induksi Oksitosin Dengan Nyeri Akut. **Metode:** Penelitian ini merupakan studi kasus, Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara, Pemeriksaan fisik, dan Observasi. **Hasil :** Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan memberikan intervensi genggam jari sebanyak 3 kali dalam sehari kali masalah nyeri akut pada klien 1 berkurang menjadi skala 2 dan klien 2 berkurang menjadi skala 3 ada penurunan skala nyeri dan terjadi perbedaan respon dari kedua klien terjadi perbedaan respon. **Diskusi:** Pada kedua klien ditemukan masalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, adapun perbedaan hasil dari intervensi yang dilakukan yaitu pada klien 1 hasil evaluasi keperawatan skala nyeri dirasakan menjadi 2 (0-10) dan pada klien 2 nyeri dirasakan menjadi 3 (0-10). Diharapkan pihak RSUD Majalaya untuk terus mempertahankan pelayanan dan perawatan yang sudah ada dan dapat menambahkan teknik relaksasi genggam jari dalam intervensi penanganan nyeri.

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Nyeri Akut, *Sectio Caesarea*

**NURSING CARE FOR MOTHERS POST SECTIO CAESAREA FOR
INDICATIONS OF FAILED OXYTOCIN INDUCTION WITH
ACUTE PAIN IN ALAMANDA OBGYN ROOM
RSUD MAJALAYA**

IIS NOVITA RAHMADHANI

211FK01044

DIII Nursing Study Program, Faculty of Nursing
Bhakti Kencana University

ABSTRACT

Background: *Sectio caesarea* is a surgical procedure to remove the fetus through an incision in the abdominal wall and uterus. The number of deliveries by the Sectio Caesarea method has increased from year to year, in West Java in 2018 there was an increase of around 15.48%. This can risk the emergence of nursing problems after cesarean sectio. The problem that often arises in post SC is the presence of postoperative wounds, which can cause pain problems, the state of postoperative pain in cesarean sectio in mothers will be a nuisance that causes limited mobilization, bonding attachment is not fulfilled, activity of daily living (ADL) is disrupted, due to increased pain intensity in postoperative cesarean sectio. So it requires nursing interventions to reduce pain. **Objective:** to describe Nursing Care for Post Sectio Caesarea Mothers for Indications of Failure to Induce Oxytocin with Acute Pain. **Methods:** This research is a case study, the data collection used by the author is interviews, physical examination, and observation. **Results:** After nursing care by providing finger grasping interventions 3 times a day the problem of acute pain in client 1 is reduced to a scale of 2 and client 2 is reduced to a scale of 3 there is a decrease in the pain scale and there is a difference in response from the two clients. **Discussion:** In both clients found acute pain problems associated with physical injury agents, as for the differences in the results of the interventions carried out, namely in client 1 the results of the nursing evaluation of the pain scale were felt to be 2 (0-10) and in client 2 the pain was felt to be 3 (0-10). It is hoped that the Majalaya Hospital will continue to maintain existing services and treatments and can add finger grip relaxation techniques in pain management interventions.

Keywords: Nursing Care, Acute Pain, Sectio Caesarea