

ABSTRAK

Nyeri dismenore primer yang dirasakan ketika menstruasi sebagai wanita. Nyeri menstruasi atau dismenore sering dialami oleh beberapa wanita khususnya di usia reproduktif, bahkan angka kejadian dismenore di dunia sangat besar sebanyak 1.769.425 wanita yang mengalami dismenore di setiap bulanya. Dismenore primer merupakan keadaan nyeri yang di akibatkan karena peningkatan prostaglandin dan tidak adanya kelainan alat reproduksi, Adapun wanita yang merasakan sakit ketika menstruasi dapat berpengaruh terhadap 50% aktivitas belajar dan harian pada wanita. tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan tingkat nyeri dismenore primer pada mahasiswa prodi d3 keperawatan universitas bhakti kencana bandung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif. Sample dalam penelitian ini menggunakan asidental sampling sebanyak 74 responden .Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responden pada rentang usia 19-22 tahun, mayoritas berusia 21 tahun sebanyak 31 responden (42%), dan usia minimal 19 tahun sebanyak 11 responden (15%). Hampir setengahnya dismenore primer yang di rasakan adalah nyeri sedang 33 orang (45 %) dan tidak ada nyeri 4 orang (15%). kesimpulan : hampir setengahnya mahasiswa prodi d3 keperawatan mengalami dismenore primer dengan nyeri sedang Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan kepada remaja putri untuk dapat menambah pengetahuannya mengenai tingkat nyeri dismenorea dan upaya penanganannya.

Kta Kunci : Tingkat nyeri, Dismenore primer

Daftar pustaka : 2 Artikel (2018-2015)

9 Jurnal (2012-2020)

ABSTRACT

Primary dysmenorrhea pain is felt when menstruating for some women. Menstrual pain or dysmenorrhea is often experienced by some women, especially in reproductive age, even the incidence of dysmenorrhea in the world is very large as many as 1,769,425 women who experience dysmenorrhea every month. Primary dysmenorrhea is a painful condition caused by an increase in prostaglandins and the absence of reproductive abnormalities. Meanwhile, women who feel pain during menstruation can affect 50% of learning and daily activities in women. The purpose of this study was to describe the level of primary dysmenorrhea pain in students of D3 Nursing Study Program at Bhakti Daring University, Bandung. This type of research is descriptive research. The sample in this study used incidental sampling as many as 74 respondents. Data collection in this study used primary data by giving questionnaires to respondents. The results of this study indicate that the characteristics of respondents in the age range of 19-22 years, the majority are 21 years old as many as 31 respondents (42%), and a minimum age of 19 years as many as 11 respondents (15%). Almost half of primary dysmenorrhea experienced moderate pain in 33 people (45%) and no pain in 4 people (15%). Conclusion: almost half of the nursing d3 study program students experience primary dysmenorrhea with moderate pain.

Key words : Pain level, Primary dysmenorrhea

Bibliography : 2 articles (2018-2015)

9 Journals (2012-2020)