

BAB VI Kesimpulan dan Saran

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait penggunaan propofol di ruang ICU salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung selama bulan Febuari 2019 sampai April 2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 32 pasien dengan 300 data penggunaan propofol.
2. Pasien terbanyak berjenis kelamin laki-laki (75%).
3. Pasien terbanyak berumur lansia (45-54) 28.13%, pasien lansia (55-64) 28.13%
4. Teknik pemberian propofol injeksi intravena terbanyak melalui drip (54%).
5. Pemberian obat dengan jumlah paling banyak pada pasien berinisial B sebanyak 35 (11,67%) pemberian dengan durasi terlama sebanyak 16 hari.
6. Terdapat 42 potensi interaksi obat (14%).
7. Terdapat 65 kombinasi obat propofol dengan obat lain. Dengan efek sinergis sebesar 46,15%, aditif 52,31%, antagonis 1,54%.
8. Semua pemberian obat propofol tepat dosis (100%).
9. Terdapat efek samping hipotensi sebesar 29,67%.

VI.2 Saran

Diharapkan pencatatan parameter klinis dan data terkait obat yang dikonsumsi pasien pada rekam medik ditulis lebih lengkap sehingga memudahkan dalam memonitoring pengaruh obat propofol terhadap kondisi pasien.