

ABSTRAK

ASI adalah makanan alami pertama untuk bayi, yang di dalamnya terkandung semua energi dan nutrisi yang di butuhkan bayi pada bulan pertama kehidupan, Beberapa masalah dalam menyusui adalah puting susu lecet, payudara bengkak dan abses payudara atau mastitis beberapa masalah itu dapat mempengaruhi pada kelancaran ASI, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan produksi pengeluaran ASI ibu. Penelitian ini bertujuan untuk membantu kelancaran ASI di PMB Bidan Yanyan Mulyani, SST, MM, M. Keb pada tahun 2021. penelitian ini menggunakan metode *study case* dengan Asuhan Kebidanan Terintegrasi Pada Masa Kehamilan Persalinan Nifas Dan Bayi Baru Lahir Dengan Pijat Oksitosin Untuk Kelancaran ASI di PMB Bidan Yanyan Mulyani, SST, MM, M. Keb. Dengan di dapatkan nya hasil dari penelitian ini bahwa pijat oksitosin yang di lakukan terdapat ke efektifitas nya. Dalam melancarkan ASI. Metode ini menggunakan pengambilan sampel teknik sampling jenuh, dengan 3 ibu post partum 4 hari selama 7 hari. Berdasarkan pengumpulan dan analisa data, di dapatkan adanya hasil Rata-rata peningkatan ASI sebelum dan sesudah pada pemberian pijat oksitosin sebelum dilakukannya intervensi pada pasien pertama yaitu 10 ml dan setelah di berikan intervensi selama 7 hari meningkat dengan jumlah 12 ml, pasien ke 2 kedua sebelum dilakukan intervensi yaitu 15 ml kemudian setelah di lakukan nya intervensi dengan lama 7 meningkat dengan jumlah 22 ml, pada pasien ke tiga sebelum di lakukannya intervensi yaitu 15 ml setelah dilakukan intervensi selama 7 hari ada pperubahan dengan peningkatan 49 ml.

Saran diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sebagai materi pembelajaran dan evaluasi khususnya bagian kebidanan.

Kata kunci : ASI, Ibu nifas, pijat oksitosin

ABSTRAK

Breast feeding is the first alari food for the baby, which in it contains energy cereal and the nutter it needs, some breastfeeding problems are. The research was intended to improve the success of PMB midwife Yanyan Mulyani, SST, MM,M.Keb in 2021 this study was a method *Study case* with integrated obstetrics training during childbirth colic postpartum and newborn babies with oxytocin massages for fluency in the PMB midwife Yanyan Mulyani, SST, MM,M.Keb. With the results of this study that the oxytocin massage performed is contained to its effectiveness. Dalarm's breastfeeding. This method uses saturated sampling technique sampling, with 3 postpartum mothers 4 days for 7 days. Based on data collection and analysis, it was found that the average increase in breast milk before and after giving oxytocin massage before the intervention in the first patient was 10 ml and after being given the intervention for 7 days it increased by 12 ml, the second patient before the second The intervention was 15 ml then after the intervention for 7 days it increased by 22 ml, in the third patient before the intervention was 15 ml after the intervention for 7 days there was a change with an increase of 49 ml.

It is hoped that with adaryra this study will make the obelisks the teaching materi and the khuisusrga evaluation of the obstetrics sectionm

Key words: Breast milk, Oxytocin massage, Post partum.