

ABSTRAK

Persalinan merupakan pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Penerapan teknik rebozo juga penting diperlukan karena dapat memberikan dampak yang sangat baik antara lain dapat memberikan kenyamanan dan berpengaruh pada proses persalinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dari teknik rebozo dengan kemajuan persalinan kala I fase aktif di klinik pratama mentari. Penelitian ini menggunakan metode study kasus dengan pendekatan *deskriptif* dengan pendekatan asuhan *continue of care* dimulai dari kehamilan, persalinan sampai masa nifas. Sampel yang digunakan yaitu dengan *purposive sampling* sebanyak 3 responden ibu bersalin primigravida kala I fase aktif. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan partograf dengan data primer dan data sekunder kemajuan persalinan kala I fase aktif. kesimpulannya dalam penelitian ini diterima sehingga ada efektifitas antara penerapan teknik rebozo dengan kemajuan persalinan kala I fase aktif. Oleh karena itu di klinik pratama mentari memperbolehkan penerapan teknik rebozo pada saat persalinan kala I fase aktif.

Kata kunci : kemajuan persalinan kala I fase aktif,persalinan,teknik rebozo

ABSTRACT

Childbirth is the expulsion of the products of conception (fetus and uri) that have been enough months or can live outside the womb through the birth canal, with or without assistance (own strength). The application of the rebozo technique is also important because it can have a very good impact, among others, can provide comfort and affect the delivery process. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the rebozo technique with the progress of active phase I labor at the Mentari pratama clinic. This study uses a case study method with a descriptive approach with a continuous of care approach starting from pregnancy, childbirth to the puerperium. The sample used was purposive sampling as many as 3 respondents who gave birth to primigravida in the first stage of the active phase. Data were collected using observation and partograph with primary data and secondary data on the progress of the active phase of the first stage of labor. In this study it was accepted that there was an effectiveness between the application of the rebozo technique and the progress of the active phase of the first stage of labor. Therefore, Mentari's pratama clinic allows the application of the rebozo technique during the active phase of the first stage of labor.

Keywords: progress of active phase I labor, labor, rebozo technique