

ABSTRAK

Faktor pola asuh yang buruk serta pola pemberian makan pada anak ialah satu diantara faktor resiko penyebab *stunting*. Mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian *stunting* pada balita. Rancangan Penelitian menggunakan *Cross Sectional* dengan sampel sebesar 84 ibu yang memiliki balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Cipadung, pengambilan sample menggunakan Teknik random sampling. Dengan variabel *independent*: pendapatan keluarga, pekerjaan ibu, Pendidikan ibu, pola asuh ibu, dan pola pemberian makan dan variabel *dependen*: *stunting*. Instrument penelitian menggunakan kuesioner Gform yang diolah dengan uji *Chi Square*. Hasil penelitian ini menunjukkan lebih dari setengahnya responden memiliki pendapatan rendah, tidak bekerja, dan Pendidikan rendah, sedangkan Sebagian besar responden memiliki pola asuh yang buruk dan pola pemberian makan yang tidak tepat. Penelitian ini menghasilkan Tidak terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian *stunting*, pekerjaan ibu dengan kejadian *stunting*, Pendidikan ibu dengan kejadian *stunting*, dan pola asuh ibu dengan kejadian *stunting* dan terdapat hubungan antara pola pemberian makan dengan kejadian *stunting* ($P\text{value}=0,000$). Puskesmas dapat lebih meningkatkan upaya mengenai pola pemberian makan yang diketahui memiliki hubungan dengan kejadian *stunting* pada balita dalam upaya pencegahan kejadian *stunting*

Kata Kunci: balita, pola pemberian makan, *Stunting*

Daftar Pustaka : 8 Buku, 16 Dokumen Pemerintah, 31 jurnal, 4 website resmi (2015-2021)

ABSTRACT

Poor parenting and feeding patterns are some of the risk factors for stunting. The purpose of this research is to know the factors that are associated with the incidence of stunting in toddlers. This research is using a Cross-Sectional design with 84 samples taken using a random sampling technique. The samples of this research are mothers who have toddlers in the work area of UPT Puskesmas Cipadung. The independent variables are family income, mother's occupation, mother's education, maternal parenting, and feeding patterns, and the dependent variable is stunting. This research is using the Gform questionnaires as its instrument which was processed with the Chi-Square test. The result of this study indicates that more than half of the respondents have low income, have no job, and have low education level, while most of the respondents have poor parenting and inappropriate feeding patterns. The result of this research show if there's no relationship between family income, mother's occupation, mother's education level, and maternal parenting with the incidence of stunting and there is a relationship between feeding patterns with the incidence of stunting (P-value = 0.000). Puskesmas can increase their efforts to prevent stunting incidence regarding feeding patterns that are known to have a relationship with stunting in toddlers.

Keywords: toddler, feeding pattern, Stunting

Bibliography: 8 books, 16 government documents, 31 journals, 4 official websites (2015-2021)