

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari 288 data pasien didapatkan 94 pasien yang telah masuk kriteria inklusi dengan penggunaan obat antihiperlipidemia yang diberikan atorvastatin, fenofibrat dan simvastatin dengan persentase atorvastatin sebesar 89,36%, fenofibrate sebesar 9,57%, dan Simvastatin 1,06%
2. Dari hasil analisis Interaksi obat di dapatkan hasil 70,21% yang terjadi interaksi obat dan 29,78% tidak terjadi interaksi. Berdasarkan tingkat keparahan , mayoritas interaksi yang terjadi yaitu interaksi moderate terdapat 98,9% diikuti oleh interaksi mayor sebesar 1,1% dan pada penelitian ini tidak ditemukan interaksi minor. Berdasarkan mekanismenya, terdapat interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik, dimana interaksi farmakokinetik terdapat sebesar 82,42% dan interaksi farmakodinamik sebesar 17,58%.

6.2 Saran

1. Bagi Rumah sakit diharapkan untuk melengkapi administrasi Rumah Sakit seperti data rekam medis dan lain – lain agar memudahkan proses pengambilan baik bagi para peneliti, ataupun kebutuhan lainnya.
2. Perlu adanya pengawasan berkelanjutan untuk mengurangi angka kejadian interaksi obat yang terjadi di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Bandung