

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

1. Dari 85 pasien di salah satu Rumah sakit di kabupaten Bandung menunjukkan terjadinya interaksi obat sebanyak 57 kasus (67,06%) dan kombinasi obat yang paling sering terjadi interaksi obat yaitu captopril-furosemid terdapat 4 kasus (4,71%). Interaksi ini meliputi 47 interaksi moderate (82,46%), 8 interaksi minor (14,04%), 2 interaksi mayor (3,51%). Jenis interaksi yang terjadi yaitu jenis interaksi Farmakodinamik 41 (71,93%) dan Farmakokinetik 16 (28,07%).
2. Potensi kejadian Inkompatibilitas obat di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Bandung menunjukkan masih terdapat kejadian inkompatibilitas obat sebanyak 29 kasus (34,12%) berdasarkan bentuk sediaan obat.

6.2 SARAN

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian serupa mengenai interaksi obat dan inkompatibilitas obat pada pasien pediatri dan melakukan penelusuran lebih terkait masalah inkompatibilitas obat. Tidak hanya dilakukan penelusuran melalui bentuk sediaan tetapi bisa berdasarkan buku HOPE (*Handbook Of Pharmaceutical Excipients*).