

Bab VI

Kesimpulan dan saran

VI.1 Kesimpulan

1) Hasil analisis data kuantitatif

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah pasien perempuan yang di diagnosa demam tifoid lebih banyak dari pada laki-laki, dapat dilihat bahwa kategori anak-anak dibawah umur memiliki persentase paling tinggi dengan persentase 52,35%, untuk pemberian antibiotik jenis antibiotik yang paling banyak digunakan yaitu Amoksisilin dengan persentase 55,86%.

2) Hasil analisa data kualitatif

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotika 96,40% tepat indikasi, antibiotik yang tepat indikasi yaitu Amoksisilin, Kloramfenikol, Tiamfenikol dan kotrimoksazol. Untuk dosis, ketepatan dosis sebesar 84,69%, ditemukan pula dosis yang tidak tepat sebesar 15.31%. Ditemukan 17 kejadian potensi interaksi pada penggunaan antibiotik kloramfenikol yang diberikan bersamaan dengan paracetamol dengan tingkat keparahan minor.

VI.2 Saran

- a. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala mengenai Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) tentang penggunaan antibiotik, untuk mengamati tingkat keberhasilan terapi antibiotik pada pasien demam tifoid.
- b. Perlu dilakukan peningkatan kerjasama antara dokter, farmasis dan tenaga kesehatan lainnya guna mengoptimalkan penggunaan antibiotik di pelayanan kesehatan Puskesmas Sukamantri kabupaten Ciamis.