

ABSTRAK

EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTIBIOTIK PADA PASIEN DEMAM TIFOID DI PUSKESMAS SUKAMANTRI KABUPATEN CIAMIS

**Oleh :
Devi Liana Putri
11151099**

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi*, penyakit ini bersifat *endemik* dan merupakan salah satu penyakit menular yang tersebar hampir di sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara observasional dengan rancangan metode deskriptif. Data yang di ambil adalah data yang berasal dari rekam medik pasien demam tifoid di Puskesmas Sukamantri Kabupaten Ciamis periode Januari-Desember 2017. Diperoleh data sebanyak 111 pasien yang masuk kedalam kategori inklusi. Analisa dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah pasien perempuan yang di diagnosa demam tifoid lebih banyak dari pada laki-laki, kategori anak-anak dibawah umur memiliki persentase paling tinggi dengan persentase 52,35%, untuk pemberian antibiotik jenis antibiotik yang paling banyak digunakan yaitu Amoksisilin dengan persentase 55,86%. penggunaan antibiotika 96,40% tepat indikasi, antibiotik yang tepat indikasi yaitu Amoksisilin, Kloramfenikol, Tiamfenikol dan kotrimoksazol. Untuk ketepatan dosis sebesar 84,69%, dan dosis yang tidak tepat sebesar 15.31%. Ditemukan 17 kejadian potensi interaksi pada penggunaan antibiotik kloramfenikol yang diberikan dengan parasetamol dengan tingkat keparahan minor. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan antibiotik belum tepat.

Kata Kunci : Antibiotik, Demam Tifoid, Evaluasi Penggunaan obat

ABSTRACT

EVALUATION OF DRUG USE ANTIBIOTICS IN PATIENTS WITH TYPHOID FEVER SUKAMANTRI AT PRIMARY HEALTH CARE CIAMIS

By
Devi Liana Putri
11151099

Abstract

Typhoid fever is an acute infectious disease of the small intestine caused by the bacterium *Salmonella typhoid*, this disease is *endemic* and is one of the infectious diseases that is spread in almost all developing countries including Indonesia. . The data taken is data derived from medical records of typhoid fever patients in the Sukamantri Health Center in Ciamis Regency for the period of January-December 2017. Data obtained were 111 patients who entered the inclusion category. The analysis is carried out qualitatively and quantitatively. The results showed that the number of female patients diagnosed with typhoid fever was greater than that of men, **the** category of underage children had the highest percentage with a percentage of 52.35%, for the most widely used antibiotic antibiotic namely Amoxicillin with a percentage 55.86%. 96.40% antibiotic use is right indication, the right antibiotic indication is Amoxicillin, Chloramphenicol, Thiamphenol and cotrimoxazole. For the accuracy of the dose of 84.69%, and an incorrect dose of 15.31%. 17 potential interactions were found in the use of chloramphenicol antibiotics given with paracetamol with minor severity. From these data it can be said that the use of antibiotics is not appropriate.

Keywords: Antibiotics, Typhoid Fever, Evaluation of Drug Use.