

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Terdapat ibu hamil trimester III yang mengalami tidak ISK di Puskesmas Cisempur sebanyak (60,6%)
2. Terdapat ibu hamil trimester III yang mengalami tidak KPD di Puskesmas Cisempur sebanyak (56,1%).
3. Terdapat hubungan antar ISK dengan KPD pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Cisempur dengan nilai p-value sebesar 0,000

6.2 Saran

1. Institusi pendidikan

Institusi pendidikan dapat meningkatkan nilai kualitas agar hasil penelitian ini dapat dipakai untuk meningkatkan pengetahuan terkait ilmu keperawatan maternitas khususnya dalam bidang antenatal care .

2. Bagi Puskesmas

Puskesmas dapat meninjau kembali mengenai skrinning dengan kolaborasi kepada BPM yang berada di wilayah Puskesmas Cisempur kepada ibu hamil mengenai risiko-risiko yang dapat mengakibatkan ketuban pecah dini, sehingga diketahui penyebab utama dan penyebab tertinggi mengenai permasalahan pada ibu hamil dan melakukan koordinasi mengenai perawatan area genitalia melalui BPM kepada ibu hamil.

3. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan bisa lebih memperhatikan terkait riwayat ISK, usia, dan risiko paritas terhadap ibu hamil, sehingga pencegahan dan penanganan bisa diberikan dengan risiko minimal terjadinya pecah ketuban pecah dini

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dan kajian pustaka mengenai penelitian lanjutan dan dapat melihat dampak ISK pada ibu hamil dan faktor penyebab lain yang mengakibatkan KPD pada ibu hamil trimester III.