

Bab VI Kesimpulan dan Saran

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah pasien diare dari periode bulan Januari-Desember 2018 sebanyak 139 pasien. Pola penggunaan obat antibiotik pada pasien diare dianalisis secara kuantitatif meliputi kriteria jenis kelamin, usia dan berdasarkan obat antibiotik. Berdasarkan kriteria jenis kelamin paling banyak terjadi yaitu pada perempuan sebanyak 57,55% (80 pasien). Sedangkan berdasarkan kriteria usia paling banyak terjadi yaitu 0-4 tahun sebanyak 34,5% dan usia 15-64 tahun sebanyak 33,1%. Kemudian berdasarkan obat antibiotik yang paling banyak digunakan yaitu thiamphenicol sebanyak 44,60% (62 pasien). Penggunaan antibiotik yang sering digunakan yaitu thiamphenicol sebanyak 44,6%. Kemudian penggunaan obat secara rasional meliputi kesesuaian indikasi, kesesuaian dosis dan potensi interaksi dianalisis secara kualitatif. Kesesuaian indikasi sebesar 100%, kesesuaian dosis meliputi dosis kurang sebesar 2,16%, dosis tepat sebesar 97,84%, dan dosis lebih sebesar 0%.

VI.2 Saran

Dalam upaya meminimalkan terjadinya masalah penggunaan obat serta meningkatkan kesesuaian penggunaan obat maka disarankan supaya evaluasi penggunaan obat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Apoteker yang berada di Puskesmas pun harus selalu

memantau kesesuaian penggunaan obat dengan cara pengkajian resep, pemantauan terapi serta edukasi penggunaan obat.