

ABSTRAK

Hipertensi salah satu penyakit yang merupakan kondisi medis yang serius secara signifikan meningkatkan resiko jantung, otak, ginjal serta penyakit lainnya. Diperkirakan ada 1,13 miliaran orang diseluruh dunia menderita penyakit hipertensi atau biasa disebut Tekanan Darah Tinggi, sebagian besar (dua pertiga) tinggal dinegara berpenghasilan rendah dan menengah. Estimatis jumlah kasus hipertensi dindonesia yaitu sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematiannya yang terjadi dindonesia yaitu sebesar 427.218 kematian. Penelitianni bertujuan untuk mengetahui evaluasi pola persepan penggunaan obat antihipertensi pada pasien Program Rujuk Balik (PRB) yang merupakan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan daripada PRBni agar Dokter Spesialis/Sub Spesialis dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi perkembangan peserta dan dapat dilakukan perubahan jenis atau dosis obat jika diperlukan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah pasien perempuan yaitu dengan angka 68,9% dan frekuensi terbanyak dikelompok umur 46-65 tahun sebanyak 67 orang (65%).

Kata Kunci : Hipertensi, PRB, pola persepan

ABSTRACT

Hypertension is one of the diseases which is a serious medical condition that significantly increases the risk of heart, brain, kidney and other diseases. It is estimated that there are 1.13 billion people worldwide suffering from hypertension or commonly called High Blood Pressure, most (two thirds) live in low and middle income countries. The estimated number of cases of hypertension in Indonesia is 63,309,620 people, while the death rate that occurs in Indonesia is 427,218 deaths. This study aims to evaluate the pattern of prescribing the use of antihypertensive drugs in patients with the Referral Program (PRB), which is a Social Security Administration Agency (BPJS) program to improve the quality of health services. The purpose of this PRB is so that Specialists/Sub-Specialists can evaluate the participants' developmental conditions and can change the type or dosage of drugs if necessary. The type of research conducted was a quantitative study with the number of female patients, namely 68.9% and the highest frequency in the age group 46-65 years as many as 67 people (65%).

Keywords : Hypertension, PRB, prescribing pattern