

GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT HIPERTENSI PADA IBU HAMIL DI RUMAH SAKIT HERMINA DEPOK

ABSTRAK

Hipertensi pada kehamilan adalah suatu kondisi dimana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Ini diukur dua kali selang 4 jam setelah pasien beristirahat. Tekanan darah tinggi yang parah dan tidak segera diobati selama kehamilan dapat menyebabkan janin tidak mendapatkan suplai darah yang tidak memadai, kekurangan nutrisi dan kekurangan oksigen ke janin, yang dapat memperlambat pertumbuhan janin. Tujuan Penelitian untuk mengetahui gambaran penggunaan gambaran obat hipertensi pada ibu hamil periode Desember 2022- Mei 2023. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental bersifat deskriptif, yaitu melakukan analisis hanya pada taraf deskripsi atau hanya menggambarkan keadaan objek yang didasarkan pada data resep di Rumah Sakit Hermina Depok. Usia ibu hamil 20-35 tahun paling banyak menggunakan obat hipertensi methyldopa dan nifedipine atau kombinasi obat tersebut. Penggunaan methyldopa sebanyak 62%, pengguna nifedipine sebanyak 67% dan penggunaan obat kombinasi methyldopa dan nifedipine sebanyak 62%.

Kata kunci : *hipertensi, ibu hamil, methyldopa, nifedipine*

DESCRIPTION OF HYPERTENSION DRUG USE IN PREGNANT WOMEN AT HERMINA HOSPITAL, DEPOK

ABSTRACT

Hypertension in pregnancy is a condition where the systolic blood pressure is more than 140 mmHg or the diastolic blood pressure is more than 90 mmHg. This is measured twice every 4 hours after the patient has rested. Severe and untreated high blood pressure during pregnancy can cause the fetus to not get adequate blood supply, lack of nutrients and lack of oxygen to the fetus, which can slow the growth of the fetus. The aim of the study was to find out an overview of the use of hypertension drug descriptions in pregnant women for the period December 2022- May 2023. This type of research includes non-experimental research that is descriptive in nature, namely conducting analysis only at the description level or only describing the condition of objects based on prescription data at Hermina Hospital Depok. Pregnant women aged 20-35 years use the hypertension drugs methyldopa and nifedipine or a combination of these drugs the most. Methldopa use was 62%, nifedipine users were 67% and methyldopa and nifedipine combination drug use was 62%.

Keywords: hypertension, pregnant women, methyldopa, nifedipine