

ABSTRAK

Latar Belakang : Gagal ginjal kronis atau *Cronic Kidney Disease* merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit yang menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Salah satu penatalaksanaan pada GJK adalah hemodialisa. Pasien dengan hemodialisa sebagian memiliki tingkat kecemasan yang tinggi sebagai akibat dampak penyakit maupun pengobatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Tingkat Kecemasan Pasien Hemodialisa di RSUD Kota Bandung. **Metode :** Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif : deskriptif dengan pendekatan deskriptif. **Populasi dan Sampel :** Populasi dalam penelitian ini sebanyak 55 responden dengan jumlah sampel dengan teknik purposive *sampling* sebanyak 36 sampel. **Teknik pengumpulan data :** menggunakan kuesioner DASS – 42 **Hasil :** Berdasarkan hasil penelitian dari 36 responden sebagian memiliki tingkat kecemasan dalam rentang normal sebanyak 5,5% kategori ringan 30,5% kategori sedang 36,1% kategori parah 19,4%, dan kategori sangat parah 8,3% **Kesimpulan :** Tingkat kecemasan dalam rentang normal sebanyak 5,5% kategori ringan 30,5% kategori sedang 36,1%, kategori parah 19,4%, dan kategori sangat parah 8,3%. **Saran :** Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi tenaga kesehatan khususnya perawat dalam memberikan informasi dalam mencegah terjadinya kecemasan pada pasien hemodialisa

Kata kunci : hemodialisa, tingkat kecemasan, GJK

Daftar Pustaka : 9 Jurnal (2011-2021)

6 buku (2011-2021)

ABSTRACT

Background: Chronic kidney failure or Chronic Kidney Disease is a progressive and irreversible renal function disorder in which the body's ability to fail to maintain metabolism and fluid and electrolyte balance causes uremia (retention of urea and other nitrogenous wastes in the blood). One of the treatments for CKD is hemodialysis. Patients with partial hemodialysis have a high level of anxiety as a result of the impact of the disease and their treatment. The purpose of this study was to determine the description of the anxiety level of hemodialysis patients at the Bandung City Hospital. **Method :** The type of research used was quantitative type: descriptive with a descriptive approach. **Population and Sample:** The population in this study were 55 respondents with a total sample of 36 samples using purposive sampling technique. **Data collection techniques:** using the DASS – 42 questionnaire. **Results:** Based on the results of the study, some of the 36 respondents had a level of anxiety in the normal range is 5.5% mild category 30.5% moderate category 36.1% severe category 19.4%, and very severe category 8.3%. **Conclusion:** The level of anxiety in the normal range is 5.5% mild category 30.5% moderate category 36.1%, severe category 19.4%, and very severe category 8.3%. **Suggestion:** This study can be used as a reference for health workers, especially nurses in providing information in preventing anxiety in hemodialysis patients.

Keywords: hemodialysis, anxiety level, CKD

Bibliography : 9 Journals (2011-2021)

6 books (2011-2021)