

ABSTRAK

WHO (World Health Organization) mencatat pada tahun 2017 angka kematian ibu sangat tinggi. Sekitar 295.000 wanita meninggal selama hamil dan melahirkan. Di Indonesia secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Di Jawa Barat tahun 2016 tercatat jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan sebanyak 799 orang (84,78/100.000 KH), dengan proporsi kematian pada ibu hamil 227 orang (20,09/100.000), pada ibu bersalin 202 orang (21,43/100.000 KH), dan pada ibu nifas 380 orang (40,32/100.000 KH). Di Kabupaten Bandung AKB mencapai 2,96/1000 kelahiran hidup, AKI mencapai 63,6/1000.000 kelahiran hidup. Di Puskesmas Garuda tahun 2019 AKB ada 5 kasus dan AKI terdapat 9 kasus penyebabnya adalah Perdarahan 5 dan PEB 4. Salah satu masalah dalam lingkup kesehatan di seluruh dunia terutama di negara berkembang adalah anemia yang diperkirakan 30% penduduknya mengalami anemia. Penelitian ini yaitu melakukan asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada Ny. R umur 26 tahun G1P0A0. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan asuhan continuity of care melalui penelaah kasus (study case) dan penelitian deskriptif. Hasil penelitian yaitu Ny. R mengalami anemia di usia kehamilan 34 minggu dengan Hb 10,8 gr/dl dengan penatalaksanaan yang diberikan yaitu pemberian tablet Fe dan sari kacang hijau sehingga terjadi kenaikan Hb 1,1 gr/dl yaitu menjadi 11,9 gr/dl selama 1 minggu pemberian sari kacang hijau. Diharapkan bagi tenaga kesehatan supaya menerapkan asuhan kebidanan secara komprehensif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Anemia, Ibu Hamil, Sari Kacang Hijau

ABSTRACT

WHO (World Health Organization) noted that in 2017 the maternal mortality rate was very high. Around 295,000 women give birth during pregnancy and childbirth. In Indonesia, in general maternal deaths occurred during the 1991-2015 period from 390 to 305 per 100,000 live births. In West Java in 2016 the number of reported maternal deaths was 799 people (84.78 / 100,000 KH), with 227 deaths (20.09 / 100,000) in pregnant women, 202 with maternal deaths (21.43 / 100, 00 KH), and for postpartum mothers 380 people (40.32 / 100,000 KH). In Bandung regency, IMR reached 2.96 / 1000 live births, AKI reached 63.6 / 1000,000 live births. In the Garuda Puskesmas in 2019, there were 5 cases of AKB and 9 cases of AKI were also caused by Bleeding 5 and PEB 4. One of the problems in health throughout the world is in developing countries that require 30% of the population who need anemia. This study aims to maintain continuity of care in NY. R is 26 years old G1P0A0. The research method used is to discuss care continuity care through case reviews (case studies) and descriptive research. The results of the study are Mrs. Correcting anemia at 34 weeks gestation with Hb 10.8 gr / dl with management given administration tablets and mung bean extract resulting in an increase in hb 1.1 g / dl ie to 11.9 gr / dl for 1 week supported by mung bean extract . It is expected that health workers are needed as assistance to the community.

Keywords: Anemia, Pregnant Women, Green Bean Extract