

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN TERINTEGRASI DENGAN PEMBERIAN KOMBINASI (SUSU KEDELAI DAN DAUN KATUK) DALAM PENINGKATAN PRODUKSI ASI PADA NY I DI PUSKESMAS SOLOKAN JERUK

Oleh
YULFINA KURNIASIH
CK.1.17.034

Masa nifas rentan terjadi masalah jika tidak ditangani dengan segera. ASI yang tidak keluar merupakan masalah ibu nifas. ASI mengandung nutrisi penting yang diperlukan bayi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara *continue of care* pada Ny.I di Puskesmas Solokan Jeruk.

Metode penelitian ini adalah *case study* secara deskriptif dengan asuhan *continue of care*. Subyek dalam penelitian ini adalah Ny.I mulai usia kehamilan 33 minggu, bersalin, bayi baru lahir, nifas, serta keluarga berencana di Puskesmas Solokan Jeruk. Serta Ny. S mulai masa nifas hari ke-1 sampai masa nifas hari ke-7 dengan masalah produksi ASI yang tidak keluar dan diberikan intervensi konsumsi kombinasi susu kedelai dan daun katuk.

Hasil dari intervensi yaitu pada Ny.I ASI mulai keluar hari ke-5 sedangkan pada Ny.S pada nifas hari ke-4.

Simpulannya pemberian kombinasi susu kedelai dengan daun katuk terhadap produksi ASI pada masa nifas cukup efektif. Hal ini sesuai dengan adanya kenaikan berat badan pada bayi sampai 400 gram dalam 7 hari. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk memperbanyak jumlah responden.

Kata Kunci : ASI, Daun Katuk, Susu Kedelai

Sumber : 27 (2010-2019)

ABSTRACT

INTEGRATED MIDWIFERY CARE BY GIVING COMBINATIONS (SOYBEAN AND KATUK LEAVES) IN INCREASING PRODUCTION OF BREAST MILK ON NY.I IN PUSKESMAS SOLOKAN JERUK

By
YULFINA KURNIASIH
CK.1.17.034

The puerperium is prone to problems if it is not treated immediately. Breast milk that does not come out is one of the problems of childbirth. Though breast milk contains important nutrients needed by babies. The purpose of this study was to provide continuing care of midwifery in Ny.I at Puskesmas Solokan Jeruk.

The research method is a case study descriptively with the approach of care of continue of care. The subjects in this study were Ny.I starting at 33 weeks gestation, childbirth, newborns, childbirth, and family planning at the Puskesmas Solokan Jeruk. And Mrs. S from the 1st day of puerperium to the puerperium on the 7th day, problems with the production of breast milk that does not come out and given the intervention consumption of a combination of soybean and katuk leaves.

The results of the intervention is that the Mrs.I breast milk starts out day 5. Whereas Mrs.S on 4th day postpartum.

The conclusion.the combination of soy milk with katuk leaves on the production of breast milk during childbirth is quite effective. This is in accordance with the existence of weight gain in infants up to 400 grams in 7 days. It is hoped for further research to increase the number of respondents.

Keywords : Breast Milk, Katuk Leaves, Soybean Milk

Source : 27 (2010-2019)