

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian gambaran penggunaan antibiotik amoksisilin pada pasien rawat jalan di Puskesmas Sumber jaya periode Maret 2020 dapat disimpulkan :

- V.1.1. Penggunaan amoksisilin tertinggi untuk kategori usia yaitu usia 0-5 Tahun dengan persentase sebesar 22%.
- V.1.2. Penggunaan amoksisilin tertinggi untuk kategori jenis kelamin yaitu jenis kelamin Perempuan dengan persentase sebesar 53%.
- V.1.3. Penggunaan amokslin tertinggi untuk kategori diagnosis yaitu Acute Nasopharyngitis (Common Cold) dengan persentase sebesar 63%.
- V.1.4. Penggunaan amoksisilin tertinggi untuk kategori jenis sediaan yaitu amoksisilin kaplet dengan persentase sebesar 58%.

VI.2. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disarankan sebagai berikut :

- VI.2.1. Dokter dalam memberikan terapi antibiotik amoksisilin kepada pasien harus secara rasional terutama untuk pasien dengan diagnosis Acute Nasopharyngitis (Common Cold) terutama pada usia 0-5 tahun.
- VI.2.2. Apoteker harus memberikan informasi penggunaan antibiotik yang benar kepada pasien agar outcome terapi dan pemakaian antibiotik tercapai dan dapat mencegah resistensi.
- VI.2.3. Dokter harus menerapkan pola persebaran yang Rasional terutama pada pola persebaran antibiotik pada semua usia dan jenis kelamin.