

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Antibiotik profilaksis yang digunakan pada pasien bedah orthopedi di salah satu rumah sakit swasta kota Bandung periode Januari sampai Maret tahun 2020 adalah antibiotik golongan cephalosporin yaitu cefazolin sebesar 90,59 %, ceftriaxone sebesar 5,13 %, cefoperazone sebesar 2,56 % dan cefepim sebesar 1,71 %.,
2. Kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis pada bedah orthopedi pada periode Januari sampai Maret 2020 tahun 2020 terhadap PPRA di salah satu rumah sakit swasta kota Bandung sebesar 90,59 %.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dibahas serta kesimpulan yang didapat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi rumah sakit

Kepada rumah sakit diharapkan untuk terus menjaga kinerja yang sudah bagus selama ini dan tetap ditingkatkan agar kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis untuk bedah orthopedi bisa mencapai 100 %, agar mutu dan kinerja pelayanan pengobatan semakin efektif dan efisien.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti lain diharapkan menambah variabel-variabel lain yang kemungkinan berhubungan dengan kejadian penggunaan antibiotik profilaksis yang tidak ada dalam penelitian ini.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi kepada masyarakat dalam pengetahuan tentang antibiotik profilaksis pada tindakan bedah orthopedi.