

GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT DIARE PADA PASIEN DIARE DI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK

Diare penyakit yang menjadi masalah di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia karena angka kesakitan dan angka kematian yang masih tinggi. angka prevalensi diare di Indonesia adalah 3,5%. Selain itu diare merupakan penyebab kematian semua umur peringkat ke-13 dengan proporsi 3,5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pengobatan penyakit diare, mengetahui jumlah dan jenis obat yang sering di distribusikan dan mengetahui terapi pengobatan antidiare yang paling banyak digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran jurnal ilmiah terpublikasi bertaraf nasional maupun internasional melalui search engine Google Scholar dengan kata kunci antidiare, diare dan zink. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan obat diare paling banyak digunakan Oralit dan Suplemen yang digunakan adalah Zink, sedangkan probiotik yang di gunakan adalah Lacto B, untuk antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Kortimoxazole, untuk terapi penunjang yang paling banyak digunakan adalah Paracetamol

Kata Kunci : Diare, Oralit , Zink

**DESCRIPTION OF DIARRHEA USE OF DIARRHEA PATIENTS IN
HEALTH SERVICES**

ABSTRACT

Diarrheal disease is a problem throughout the world, both in developed and developing countries like Indonesia because of morbidity and mortality rates that are still high. the prevalence of diarrhea in Indonesia is 3.5%. Besides diarrhea is the cause of death for all ages ranked 13th with a proportion of 3.5%. This study aims to find a picture of the treatment of diarrheal diseases, find out the number and types of drugs that are often distributed and find out which antidiarrheal treatment therapies are most widely used. Data collection was carried out by searching scientific papers published nationally and internationally through the Google Scholar search engine with keywords antidiarrheal, diarrhea and zinc. The results showed the use of diarrheal drugs most commonly used oral and supplements used were zinc, while the probiotics used were Lacto B, for the most widely used antibiotic was cortimoxazole, for the most widely used therapeutic support was paracetamol

Keywords: Diarrhea, ORS, Zink