

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Pola regimentasi kemoterapi kanker kolon periode Januari-Desember tahun 2019 yang terbanyak adalah Capox.
2. Prevalensi usia yang paling dominan terdapat pada pasien dengan kelompok usia 60-69 tahun.
3. Prevalensi jenis kelamin yang paling dominan terdapat pada pasien dengan jenis kelamin Laki-Laki.

VI.2 Saran

Setelah menganalisa dan membuat kesimpulan dari penelitian ini, penulis dapat menyarankan beberapa hal yaitu:

1. IFRS mengadakan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik lagi dalam pengadaan obat kanker kolon setelah mengetahui pola regimentasi kemoterapi yang diberikan dokter pada kanker kolorektal.
2. TFT bekerja sama dengan komite medik rumah sakit merencanakan dan membuat standar pelayanan atau protokol pemberian kemoterapi pada kanker kolon dan kanker-kanker lainnya.
3. Meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dan dokumentasi yang lebih lengkap antara farmasi, dokter, dan perawat dalam melaksanakan serangkaian prosedur kemoterapi.
4. IFRS meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas farmasi dalam melakukan pelayanan kemoterapi khususnya pada kanker kolorektal.