

ABSTRAK

Latar Belakang: sectio caesarea merupakan suatu tindakan melahirkan dengan berat diatas 500 gram, melalui sayatan atau insisi pada dinding abdomen dan uterus yang masih utuh. sectio caesarea dapat terjadi dengan berbagai faktor diantaranya adalah faktor (umur , paritas ibu,riwayat sc, partus lama, pre-eklamsi/eklamsia, post date, kpd, gawat janin, malpresentasi) **Tujuan penelitian :** Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea di Rumah Sakit Puri Asih Jatisari. **Jenis Penelitian :** menggunakan jenis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. **Populasi dan sampel :** penelitian ini sebanyak 162 dengan jumlah sampel 62 sampel. Instrumen yang digunakan pada penelitian adalah lembar *cheklist* **Hasil :** menunjukkan bahwa sectio cesarea terjadi dipengaruhi beberapa faktor, sebagian kecil pasien dengan section caesarea berada pada rentang umuer yang beresiko < 20 dan 35 > tahun, lebih dari setengah Tindakan section caesarea berada pada paritas yang beresiko 0 dan 4, kurang dari setengah Tindakan section caesarea berada pada riwayat sectio caesarea sebelumnya, Sebagian kecil Tindakan sectio caesarea berada pada faktor partus lama, Sebagian kecil pasien section caesarea berada faktor pre – eklamsi, Sebagian kecil pasien section caesarea berada pada faktor post date, Sebagian kecil section caesarea berada pada faktor kpd, Sebagian kecil pasien section caesarea berada pada faktor gawat janin dan Sebagian kecil pasien section caesarea berada pada faktor mol presentasi. **kesimpulan dan Saran :** terdapat 9 faktor yang dapat menyebabkan seorang ibu dilakukan SC tetapi tidak semua ditemukan faktor penyebab seorang ibu dilakukan SC sehingga saran nya. bagi Rumah Sakit bisa mengidentifikasi kemungkinan resiko ibu untuk bersalin dengan sectio caesarea dan dapat memberikan informasi pada ibu hamil tentang resiko atau faktor penyebab sectio caesarea pada saat kunjungan antenatal.

Kata kunci : Faktor penyebab terjadinya SC, sectio caesarea.

Daftar pustaka : 10 jurnal (2010-2021)

7 buku (2010-2021)

ABSTRACT

Background: sectio caesarea is an act of giving birth weighing more than 500 grams, through an incision or incision on the abdominal wall and uterus that is still intact. sectio caesarea can occur with various factors including factors (age, maternal parity, history of sc, prolonged labor, pre-eclampsia/eclampsia, post date, kpd, fetal distress, malpresentation). Puri Asih Jatisari Hospital. **Type of Research:** using a quantitative type with a descriptive approach. **Population and sample:** this study was 162 with a total sample of 62 samples. The instrument used in this study was a checklist. **Results:** showed that cesarean section occurred influenced by several factors, a small proportion of patients with cesarean section were in the age range at risk <20-35> years, more than half of Caesarean section procedures were at risk parity 0 > 4, less than half of caesarean section procedures are in the history of previous caesarean section, a small proportion of caesarean section procedures are due to prolonged labor, a small proportion of caesarean section patients have pre-eclampsia, a small proportion of caesarean section patients are post date factors, a small proportion cesarean section is in the kpd factor, a small proportion of cesarean section patients are in fetal distress factor and a small proportion of cesarean section patients are in the mole factor presentation. **Conclusions and Suggestions:** there are 9 factors that can cause a mother to have a CS but NOT all factors are found to be the cause of a mother to have a CS so that's the advice. Hospitals can identify possible risks for mothers to give birth by sectio caesarea and can provide information to pregnant women about the risks or factors that cause sectio caesarea during antenatal visits.

Keywords: Factors causing SC, sectio caesarean.

Bibliography: 10 journals (2011-2021)

7 books (2011-2021)