

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul pola penggunaan obat Omeprazole di poli penyakit dalam Rumah Sakit Wjya Kusumumah Kuningan periode bulan Oktober – Desember 2019 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Omeprazole tunggal dengan dosis (2x40 mg) digunakan paling banyak 20 pasien
- b. Penggunaan Omeprazole dikombinasi dengan obat tukak lambung lainnya sebanyak 45 pasien

Misalnya : Omeprazole + metochlor + sucralral
 Omeprazole + rebamipide + domperidon Tabet
 Omeprazole + antasida Sirup + rebamipide

Penggunaan Omprazole sudah sesuai dengan Formularium Nasional dengan ketentuan dosis maksimal tidk lebih dari 40 mg / hari

5.2. Saran

1. diperlukan peneitian lebih lanjut dengan menggunakan metode prospektif agar peneliti dapat mengamati kondisi pasien dan permasalahan terkait terapi obat secara langsung, dapat beriteraksi enagn pasien, dokter dan para klinisi serta di hasilkan peofil penggunaan obat yag lebih refresentatif
2. Diperlukan pemeriksaan laboratoium secara rutin sehnggdi dapatkan data yang lengkap utuk menunjang pemantaua terapi.
3. Farmasis dihrapkan dapat memberikan informasi dan edukasi secara langsung kepada tenaga kesehatan lain dan pasien terkait penggunaan obat, ehingga teercapai efek terapi yan optimal.