

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Pola Peresepan Azithromisin pada pasien dengan gejala dan penyakit Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kota Majalengka diperoleh kesimpulan :

1. Dosis Azithromisin yang digunakan kepada penyakit Covid-19 tidak tepat dosis sebanyak 5 resep (16,67%) sedangkan yang tepat dosis sebanyak 25 resep (83,33%).
2. Untuk aturan pemakaian Azithromisin pada penyakit Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres sesudah makan dengan jumlah 30 resep (100%).
3. Frekuensi pemberian Azithromisin pada penyakit Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres terbanyak yaitu satu tablet perhari sebanyak 25 resep (83,33%).
4. Lama pemberian Azithromisin pada penyakit Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres yaitu 5 tablet selama 5 hari sebanyak 19 resep (63,33%).

Pola peresepan Azithromycin pada pasien dengan gejala dan penyakit Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kota Majalengka masih ada yang belum sesuai dengan literatur. Baik dari dosis pemakaian obat, frekuensi pemberian obat, dan lama pemberian obat.

6.2 Saran

1. Butuh terdapatnya riset dengan memakai tata cara prospektif, supaya diperoleh hasil yang bisa lebih representatif.
2. Agar ditingkatkan lagi tentang penyusunan kelengkapan resep penderita paling utama untuk aturan pakai obat serta berat tubuh penderita.

3. Dan perlu dicoba sosialisasi serta pengawasan lebih lanjut dalam pemakaian antibiotik, khususnya Azithromisin.