

ABSTRAK

Latar Belakang: Typoid merupakan masalah keperawatan terbanyak pada kasus dengan gangguan pencernaan. Gejala yang terdapat pada klien dengan Typoid adalah Penurunan Nafsu makan sehingga harus diatasi dengan pemberian Asuhan keperawatan dengan manajemen makan dan pemantauan nutrisi dengan itu penulis mengangkat Masalah pada Thyoid kasus ini adalah Risiko Defisit Nutrisi. **Metode:** Adapun metode yang dipakai penelitian yaitu menggunakan Deksripsi dengan pendekatan studi kasus. Responden pada penelitian adalah 2 orang pasien dengan pasien Typoid masalah asuhan keperawatan Risiko Defisit Nutrisi Di Ruang Nusa Indah Atas RSUD Dr Slamet Garut. Tujuan Mampu memahami dan melaksanakan Asuhan Keperawatan pada Anak dengan typoid dengan masalah keperawatan Risiko Defisit Nutrisi. **Hasil:** setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam pada klien 1 dan 1x24 jam pada klien 2 dengan memberikan intervensi keperawatan manajemen makan dan pemberian cairan, masalah keperawatan Risiko Defisit Nutrisi klien 1 dan klien 2 teratasi sebagian. Dengan hasil akhir klien 1 dapat menghabiskan $\frac{1}{2}$ porsi dan klien 2 menghabiskan $\frac{1}{2}$ porsi dan intervensi dihentikan dan dilanjutkan dirumah karena pasien pulang **Diskusi:** klien dengan masalah Typoid dengan masalah keperawatan tidak selalu memiliki respon yang sama saat dilakukan intervensi.pada kasus respon pada klien 1 dan klien 2 teratasi sebagian. Intervensi yang dilakukan adalah Pemantauan makanan, memberikan makanan dengan porsi hangat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan status kesehatan klien sebelumnya. Sehingga perawat harus melakukan asuhan keperawatan yang komprehensif .

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Typoid, Risiko Defisit Nutrisi.

ABSTRACT

Background : *Typoid is the most common nursing problem in cases with digestive disorders. The symptoms found in client with Typoid are decreased appetite, so they must be overcome by providing nursing care with food management and nutritional monitoring. With that the authors raise the problem with that the authors raise the problem with thypoid in this case, the risk of nutritional deficits.* **Method :** *the research method used is a description with a case study approach. Respondents in the study were 2 patients with Typoid patients with nursing care problems Risk of Nutritional Deficits in the Uppe Nusa Indah Room at RSU dr Slamet Garut. Objectives able to understand and carry out Nursing care in Children With Typoid with Nursing Problems Risk For Nutritional Deficits. Results : After 2x24 hours of nursing action on client 1 and 1x24 hours on client 2 by providing nursing interventions for feeding management and administration of fluids, nursing problems for client 1 and client 2 Nutrition Deficit Risk are Partially resolved. With the end result client 1 can speed ½ portion and client 2 spends ½ portion and the intervention is stopped and continued at home because the patient goes home* **Objective :** *able to understand and carry out Nursing Care in Children with Typhoid with Nutrition Deficit.* **Discussion :** *client with Nursing Typhoid problems nursing problems do not always have the same response when intervention is carried out. In cases the response to client 1 and client 2 is partially resolved. The interventions carried out were monitoring food, giving food with war, portions. This is influenced by the client's condition and previous health status. So nurses must carry out comprehensive nursing care.*

Keywords : *Nursing Care, Typoid, Risk of Nutritional Deficit.*