

ABSTRAK

REVIEW ARTIKEL: PROFIL PENGGUNAAN OBAT TUKAK LAMBUNG DI RUMAH SAKIT

FIKRI FATHONI HERDIANA

31181029

Peptic ulcer atau tukak lambung adalah salah satu penyakit gangguan saluran pencernaan yang paling sering terjadi. Hal yang dapat menyebabkan tukak lambung adalah penggunaan Obat Anti Inflamasi Non Steroid (OAINS), steroid, merokok, *Helicobacter pylori* dan diet tinggi garam. Dalam pemberian obat, terdapat bahaya efek terapeutik yang lebih kecil dari yang diperkirakan. Salah satu cara untuk mencegah kegagalan dalam pengobatan tukak lambung adalah dengan menggunakan obat secara hati-hati. *Review* artikel ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasien tukak lambung berdasarkan jenis kelamin dan usia serta mengetahui profil penggunaan obat tukak lambung yang digunakan. *Review* artikel ini diperoleh dengan penelusuran jurnal ilmiah nasional maupun internasional melalui *search engine: Google Scholar, PubMed, Sciencedirect*, serta *Proquest*. Sebanyak 7 artikel yang di *review* sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan pasien berjenis kelamin wanita lebih beresiko terkena penyakit tukak lambung dibandingkan dengan pria dan rentang usia 20-50 tahun paling banyak terkena penyakit tukak lambung sedangkan untuk terapi tukak lambung yang paling banyak digunakan adalah golongan *PPI (Proton Pump inhibitor)*.

Kata Kunci : tukak lambung, *peptic ulcer*, profil penggunaan obat tukak lambung, tukak lambung di rumah sakit.

ABSTRACT

REVIEW ARTIKEL: PROFILE OF PEPTIC ULCER TREATMENT IN HOSPITAL

FIKRI FATHONI HERDIANA

31181029

Peptic ulcer is one of the most common digestive tract disorders. Things that can cause gastric ulcers are the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), steroids, smoking, Helicobacter pylori and a high-salt diet. In drug administration, there is a danger of a smaller than expected therapeutic effect. One way to prevent failure in the treatment of peptic ulcers is to use drugs with caution. This article review aims to determine the characteristics of peptic ulcer patients based on gender and age and to find out the profile of the use of gastric ulcer drugs used. This article review was obtained by searching national and international scientific journals through search engines: Google Scholar, PubMed, Sciencedirect, and Proquest. A total of 7 articles were reviewed according to the inclusion and exclusion criteria, it was found that female patients are more at risk of developing gastric ulcer disease compared to men and the age range of 20-50 years is the most affected by gastric ulcer disease, while for gastric ulcer therapy the most widely used is the group. PPI (Proton Pump Inhibitor).

Keywords : *peptic ulcer, peptic ulcer drug use profile, peptic ulcer in hospital.*