

**GAMBARAN PENGOBATAN DIARE PADA PASIEN PEDIATRI BPJS
DAN UMUM INSTALASI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) KOTA BANDUNG PERIODE NOVEMBER 2021 –
JANUARI 2022**

ABSTRAK

Penyakit diare ialah penyebab utama morbiditas anak di dunia, dan sebagian besar disebabkan oleh makanan dan sumber air yang terkontaminasi. Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung pada tahun 2021 terdapat 184 kejadian diare pada pasien pediatri yang menjalani rawat inap, pasien BPJS maupun Umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui obat yang sering diresepkan oleh Dokter dalam menangani diare dan untuk mengetahui ada / tidaknya perbedaan pemberian penggunaan obat diare pada pasien pediatri antara BPJS dan Non BPJS (Umum). Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif yang bersifat non eksperimental, dengan pengambilan data secara retrospektif dengan melihat kartu pengobatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini berdasarkan jenis kelamin pasien diare pada anak lebih banyak pada pasien laki-laki yaitu sebanyak 113 anak (59,47%), berdasarkan pasien diare pada anak lebih banyak di rentang usia 6 – 12 Bulan sebanyak 54 anak (28,42%), dan berdasarkan penggunaan keseluruhan obat pada pasien diare lebih banyak menggunakan Zinc dan Oralit.

Kata kunci: Diare, Pediatri, Rumah Sakit

**DESCRIPTION OF DIARRHEA TREATMENT IN BPJS PATIENTS AND
GENERAL INPATIENT INSTALLATIONS IN THE REGIONAL GENERAL
HOSPITAL (RSUD) BANDUNG CITY PERIOD OF NOVEMBER 2021 –
JANUARY 2022**

ABSTRACT

Diarrhea is a major cause of child morbidity in the world, and is mostly caused by contaminated food and water sources. At the Bandung City Regional General Hospital (RSUD) in 2021 there were 184 cases of diarrhea in pediatric patients undergoing inpatient care, BPJS patients and the general public. The purpose of this study is to determine the drugs that are often prescribed by doctors in dealing with diarrhea and to determine whether there is a difference in the use of diarrhea drugs in pediatric patients between BPJS and Non BPJS (General). In this study, the research method used was descriptive non-experimental method, with retrospective data collection by looking at the patient's treatment card at the Bandung City General Hospital (RSUD). The results of this study based on the gender of diarrhea patients in children more in male patients as many as 113 children (59.47%), based on diarrhea patients in children more in the age range 6-12 months as many as 54 children (28.42 %), and based on the overall use of the drug in diarrhea patients, they used more zinc and ORS.

Keywords: *Diarrhea, Pediatrics, Hospital*