

ABSTRAK

Kematian bayi dan balita salah satunya disebabkan oleh penyakit menular, salah satu penyakit Pneumonia membunuh 808.694 anak di bawah usia 5 tahun 2017, terhitung 15% dari semua kematian anak di bawah usia 5 tahun. Secara global pneumonia atau radang paru jadi pembunuh terbesar pada anak di seluruh dunia. Indonesia termasuk peringkat ke-8 di tahun 2019. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rumah tangga dengan kejadian pneumonia pada balita. Jenis penelitian studi *systematic review*. Data penelitian diakses dari penelusuran artikel publikasi pada *google scholar*. Metode pengumpulan dokumentasi. Metode analisis data meta-sintesis dengan pendekatan meta analisis. Hasil kajian terdapat 8 jurnal yang terakreditasi, yakni 1 jurnal CTPS adanya hubungan, 4 jurnal menimbang bayi dan balita dengan 2 jurnal adanya hubungan dan 2 jurnal tidak ada hubungan, 8 jurnal ASI eksklusif dengan 5 jurnal adanya hubungan dan 3 jurnal tidak adanya hubungan, 4 jurnal mengonsumsi buah dan sayur dengan 3 jurnal adanya hubungan dan 1 jurnal tidak adanya hubungan, 3 jurnal tidak merokok di dalam rumah dengan 1 jurnal adanya hubungan dan 2 jurnal tidak adanya hubungan dengan kejadian pneumonia pada balita. Disarankan bagi individu, keluarga maupun masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menurunkan risiko kejadian pneumonia yaitu dengan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rumah tangga.

Kata Kunci : PHBS, Pneumonia, Balita

Daftar Pustaka : 2 Buku, 5 Dokumen Pemerintah, 54 Jurnal (2010-2020)

ABSTRACT

One of the deaths of infants and toddlers is caused by infectious diseases, one of which pneumonia kills 808,694 children under the age of 5 in 2017, accounting for 15% of all child deaths under the age of 5. Globally pneumonia or pneumonia is the biggest killer in children throughout the world. Indonesia is ranked 8th in 2019. The purpose of this study was to determine the relationship of clean and healthy living behavior (PHBS) of households with the incidence of pneumonia in infants. Types of research studies are systematic reviews. The research data is accessed from the search for publication articles on Google Scholar. Document completion method. The meta-synthesis data analysis method uses the meta aggression approach. The results of the study there were 8 accredited journals, namely 1 CTPS journal with a relationship, 4 journals weighing infants and toddlers with 2 journals having a relationship and 2 journals with no relationship, 8 exclusive ASI journals with 5 related journals and 3 non-related journals, 4 journals consuming fruits and vegetables with 3 related journals and 1 non-related journal, 3 journals do not smoke at home with 1 journal having a relationship and 2 journals not having a relationship with the incidence of pneumonia in toddlers. Recommended for individuals, families and the community should participate in reducing the risk of pneumonia by always implementing clean and healthy living behavior (PHBS) of the household.

Keywords: PHBS, Pneumonia, Toddler

Bibliography: 2 Books, 5 Government Documents, 54 Journals (2010-2020)