

ABSTRAK

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit menular yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia. World Health Organization (WHO) memperkirakan insiden Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di negara berkembang dengan angka kematian balita di atas 40 per 1000 kelahiran hidup adalah 15 % - 20 % pertahun pada golongan usia balita. Di Indonesia, ISPA sering disebut sebagai “pembunuh utama”. Kematian akibat ISPA di perkirakan adalah 5 kasus dari 1000 balita. itu berarti setiap tahun 150.000 balita meninggal, atau kasus ISPA per hari 416 kasus yang di akibatkan oleh penyakit ISPA. Data penelitian di akses dari penelusuran artikel pada *google scholar*. Hasil kajian didapatkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita diantaranya yaitu Status imunisasi, status gizi, Kepadatan hunian, dan Luas ventilasi. Penelitian ini diharapkan saran bagi institusi agar dapat menambah referensi yang ada dan dapat di gunakan oleh semua pihak terutama jurusan kesehatan masyarakat dan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita.

Kata kunci : Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), status imunisasi, status gizi, kepadatan hunian, luas ventilasi.

ABSTRACT

Acute Respiratory Infection (ARI) is an infectious disease which is the main cause of morbidity and mortality in the world. The World Health Organization (WHO) estimates that the incidence of Acute Respiratory Infections (ISPA) in developing countries with under-five mortality rates above 40 per 1000 live births is 15% - 20% per year in the under-five age group. In Indonesia, ISPA is often referred to as the "main killer". Death due to ARI is estimated to be 5 cases out of 1000 under five. That means that every year 150,000 children under five die, or 416 cases of ARI per day due to ARI disease. The research data is accessed from searching articles on google scholar. The results of the study showed that the factors associated with the incidence of ARI in children under five include immunization status, nutritional status, occupancy density, and ventilation area. This research is expected to suggest suggestions for institutions in order to add to existing references that can be used by all parties, especially the department of public health and can provide information about factors related to the incidence of ARI in toddlers.

Keywords: Acute Respiratory Infection (ARI), immunization status, nutritional status, occupancy density, ventilation area.