

ABSTRAK

Latar belakang: Menurut *American Diabetes Association* (ADA) (2016), Diabetes Melitus (DM) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yakni, DM tipe 1, DM tipe 2, DM Gestasional dan DM tipe lain. Beberapa tipe yang ada, DM tipe 2 merupakan salah satu jenis yang paling banyak ditemukan yaitu lebih dari 90-95%. Faktor pencetus dari DM tipe 2 yakni berupa obesitas, mengkonsumsi makanan instan, terlalu banyak makanan karbohidrat, merokok, dan stres, kerusakan pada sel pankreas, dan kelainan hormonal (Smeltzer & Bare, 2016). Data yang didapatkan di RSUD Dr. Slamet Garut pada tahun 2019 penyakit Diabetes Melitus merupakan penyakit yang menempati posisi 7 dari 10 penyakit terbanyak jumlahnya 378 kasus. **Tujuan:** Mampu melaksanakan asuhan keperawatan yang bermutu pada Klien yang mengalami Diabetes Mellitus Tipe II dengan Kerusakan Integritas Kulit di Ruang Agate Atas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut. **Metode:** Dalam penelitian studi kasus ini menggunakan metode deskriptif, Studi kasus dilakukan pada dua klien dengan Klien yang mengalami Diabetes Mellitus Tipe II dengan Kerusakan Integritas Kulit. **Hasil:** Pemeriksaan klien 1 dan 2 adalah kerusakan integritas kulit pada Klien yang mengalami Diabetes Mellitus Tipe II. Proses evaluasi asuhan keperawatan klien 1 dan klien 2 sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pada kedua klien terdapat, kerusakan integritas kulit sudah teratasi sebagian, masih terdapat luka sepanjang 2-3 cm tapi luka kering dan tidak bernanah tetap melanjutkan intervensi yang sebelumnya sudah disusun. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan nekrosis kerusakan jaringan (nekrosis luka ulkus), Pengelolaan holistic ulkus/gangren diabetic membutuhkan kerjasama multidisipliner

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Diabetes Melitus Type II
Daftar Pustaka : 20 buku(2013-2019), 10 jurnal (2009-2019)

ABSTRACT

Background: According to the *American Diabetes Association* (ADA) (2016), *Diabetes Mellitus* (DM) can be classified into several types, namely, type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes and other types of diabetes. Several types exist, type 2 diabetes is one of the most common types, which is more than 90-95%. The triggering factors of type 2 diabetes are obesity, consuming instant food, too much carbohydrate food, smoking, and stress, damage to pancreatic cells, and hormonal disorders (Smeltzer & Bare, 2016). The data obtained at RSUD Dr. Slamet Garut in 2019 *Diabetes Mellitus* is a disease that occupies the 7th position of the 10 most diseases with 378 cases. **Objective:** Able to carry out quality nursing care for clients with Type II *Diabetes Mellitus* with Damage to Skin Integrity in the Upper Agate Room at the Regional General Hospital Dr. Slamet Garut. **Methods:** In this case study research using a descriptive method, a case study was conducted on two clients with a client who experienced Type II *Diabetes Mellitus* with impaired integrity of Kulit. **Result:** The process of evaluating client 1 and client 2 nursing care was in accordance with the planned objectives. In both clients, the damage to skin integrity has been partially resolved, there are still wounds 2-3 cm long but the wound is dry and not festering, continuing the previously arranged intervention. Damage to skin integrity is associated with tissue damage necrosis (ulcer wound necrosis), Holistic management Diabetic ulcers / gangrene require multidisciplinary collaboration

Keywords: Nursing care, Diabetesmelitus Tipe II

Bibliography: 20 books (2013-2019), 10 journals (2009-2019)