

ABSTRAK

Latar Belakang : Chronic Kidney Disease (CKD)/Gagal ginjal kronik terjadi akibat penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menimbulkan adanya kelebihan volume cairan. Oleh karena itu, pasien gagal ginjal kronik dengan kelebihan volume cairan harus diberikan asuhan keperawatan yang komprehensif untuk mencegah komplikasi akibat kelebihan volume cairan. **Tujuan :** Mampu Melakukan Asuhan Keperawatan pada pasien Gagal Ginjal Kronik Dengan Masalah Kelebihan Volume Cairan Di RSUD dr. Slamet Garut **Metode :** studi kasus dilakukan untuk mengeksplorasi masalah keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik dan menyertakan dari berbagai sumber informasi. Studi kasus ini dilakukan pada dua orang pasien gagal ginjal kronik dengan masalah keperawatan Kelebihan Volume Cairan. **Hasil :** Setelah dilakukan Tindakan Keperawatan selama 3x24 jam pada pasien 1 masalah teratasi Sebagian, sedangkan pasien 2 masalah teratasi Sebagian, hanya saja yang membedakan di kedua pasien itu pasien 1 diijinkan pulang tetapi tidak dengan pasien 2. **Diskusi :** Pasien gagal ginjal kronik dengan masalah keperawatan kelebihan volume cairan tidak selalu memiliki respon yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi atau status Kesehatan pasien sebelumnya dan lamanya hari rawat. Sehingga perawat mampu melakukan asuhan keperawatan pemantauan cairan intake dan output dengan chart untuk menangani masalah kelebihan volume cairan terutama pada pasien gagal ginjal kronis.

Kata Kunci : Chronic Kidney Disease (CKD), Kelebihan Volume Cairan, Asuhan Keperawatan

Daftar Pustaka : 6 Buku (2010-2020), 5 jurnal (2010-2018), 11 website

ABSTRACT

Background : Chronic Kidney Disease (CKD) / Chronic renal failure occurs due to a progressive and irreversible decline in kidney function in maintaining metabolism and fluid and electrolyte balance, resulting in excess fluid volume. Therefore, patients with chronic renal failure with excess fluid volume should be provided with the nursing care provided to prevent excess fluid volume.

Objective : Able to perform nursing care for patients with chronic renal failure with fluid volume excess problems in dr. Slamet Garut Hospital. **Methods :** a case study was conducted to explore nursing problems in patients with chronic renal failure and included various sources of information. This case study was conducted on two chronic renal failure patients with fluid volume excess nursing problems. Results: After 3x24 hours of nursing action in patient 1, the problem was partially resolved, while 2 problems were partially resolved, but the difference between the two patients was that patient 1 was allowed to go home but not with patient 2.

Discussion: Patients with chronic renal failure with nursing problems excess fluid volume does not always have the same response. This is influenced by the patient's previous health condition or status and the length of days of stay. So that nurses are able to perform nursing care monitoring of fluid intake and output with charts to deal with the problem of excess fluid volume, especially in patients with chronic renal failure.

Keywords: Chronic Kidney Disease (CKD), Excess Fluid Volume, Nursing Care

Bibliography: 6 Books (2010-2020), 5 journals (2010-2018), 11 websites