

BAB IV. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukan pola penggunaan antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) di RSAU dr. M. Salamun pada tahun 2021 terapi tunggal yaitu Ciprofloxacin (42.21%), Cefixime (30.52%), Pepemidic Acid (11.69%), Cefadroxil (2.60%), Ceftriaxone (1.95%), Amoxicillin (1.95%), Levofloxacin (1.30%), Cefotaxime (0.65%) dan Doxycycline (0.65%). Sedangkan untuk terapi kombinasi yaitu Cotrimoxazol (1.30%), Ciprofloxacin + Pipemidic Acid (1.95%), Cefixime + Pipemidic Acid (1.30%), Ciprofloxacin + Clindamycin (1.30%) dan Cotromoxazol + Pipemidic Acid (0.65%).
2. Ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien ISK di RSAU dr. M. Salamun pada tahun 2021 ditinjau dari beberapa parameter yaitu tepat indikasi (100%), tepat obat (96.10%), tepat dosis (79.22%), tepat frekuensi (93.51%) dan tepat durasi (70.13%) dari 154 kasus yang didapat dari rekam medis dan SIMRS.

6.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian serupa dengan rancangan prospektif untuk dapat mengkaji keseluruhan rasionalitas penggunaan antibiotik sehingga penggunaan obat rasional dapat dikaji secara representative. Selain itu, dengan rancangan prospektif penelitian dapat melakukan wawancara dengan dokter penulis resep untuk mengetahui alasan pemilihan terapi antibiotik yang diterima pasien.