

ABSTRAK

Penyakit ISPA merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada balita di dunia karena sistem kekebalan tubuh balita yang mudah menurun dan sangat rendah dari pada orang dewasa. Populasi penduduk yang semakin bertambah dan tidak terkendali mengakibatkan kepadatan penduduk disatu wilayah tidak tertata dengan baik dari aspek sosial, budaya. Pada tahun 2015 di Indonesia terjadi peningkatan penyakit ISPA menjadi 63,45%, angka kematian pada balita akibat ISPA 0,16% (Kemenkes RI, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil penelitian mengenai faktor risiko kejadian ISPA pada balita. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Populasi pada penelitian ini adalah 135 jurnal yang terdiri dari 105 jurnal nasional dan 30 jurnal internasional. Sampel pada penelitian ini yaitu 4 jurnal yang ditentukan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi menggunakan teknik *purposive sampling*. Lokasi pengambilan data melalui google scholar dan pubmed. Hasil penelitian dari 4 jurnal didapatkan 3 faktor risiko terjadinya ISPA pada balita yang paling utama yaitu faktor pemberian ASI eksklusif, kebiasaan merokok anggota keluarga dan kepadatan hunian rumah. Pentingnya informasi terkait dengan faktor risiko ISPA dan harus lebih diperhatikan untuk menghindari faktor risiko.

Kata kunci : faktor risiko, terjadinya ISPA, balita

ABSTRACT

ARI is a disease that can cause death in children under five in the world because the immune system of toddlers is easy to decline and is very low than adults. The population is increasing and uncontrolled resulting in population density in one area that is not well organized from a social aspect, culture. In 2015 in Indonesia there was an increase in ARI disease to 63.45%, the mortality rate for children under five due to ISPA was 0.16% (Ministry of Health RI, 2016). This study aims to identify the results of research on risk factors for the incidence of ARI in toddlers. This type of research is a literature study. The population in this study were 135 journals consisting of 105 national journals and 30 international journals. The samples in this research were 4 journals which were determined according to the inclusion and exclusion criteria using purposive sampling technique. Location of data collection via google scholar and pubmed. The results of the research from 4 journals found that there were 3 risk factors for the occurrence of ARI in toddlers, the most important were factors of exclusive breastfeeding, smoking habits of family members and residential density. Every toddler has different risk factors for the incidence of ARI. The importance of information related to the risk factors for ARI and should be paid more attention to avoid risk factors.

Key words: risk factors, ARI, toddlers