

ABSTRAK**Hubungan Karakteristik Pasien dengan Kepatuhan
Minum Obat Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Jawa Barat****Oleh :****Muhamad Gagan Ramdani****11181082**

Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa kronis memiliki gejala berupa halusinasi, delusi dan waham. Berdasarkan prevalensinya skizofrenia di Provinsi Jawa Barat sebanyak 5%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hubungan Karakteristik Pasien dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Pada Penelitian ini digunakan *observasional* deskriptif secara *cross-sectional* dengan menggunakan data konkuren berupa data primer pasien rawat jalan periode Maret-Mei 2022. Pada Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner *Medication Adherence Rating Scale* (MARS). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *kormogov-smirnov*. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pasien skizofrenia memiliki tingkat kepatuhan minum obat yang tinggi sebanyak 18 orang (21%), tingkat kepatuhan minum obat yang sedang sebanyak 66 pasien (78%), sedangkan tingkat kepatuhan minum obat rendah sebanyak 1 orang (1%). Hasil uji *kormogov-smirnov* didapatkan jenis kelamin dengan nilai p value (0,571), usia nilai p value (0,940), pendidikan nilai p value (0,999), pekerjaan nilai p value (0,527), dan lama pengobatan nilai p value (1,000). Jika dilihat hasil analisis didapatkan nilai $p > 0,05$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik pasien dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Skizofrenia, kuesioner MARS, Kepatuhan minum obat

ABSTRACT

***Relationship between Patient Characteristics and Adherence
Taking Medication for Schizophrenic Patients in a Mental Hospital
West Java province***

By :

Muhamad Gagan Ramdani

11181082

Schizophrenia is a chronic mental disorder that has symptoms in the form of hallucinations, delusions. Based on the prevalence of schizophrenia in West Java Province as much as 5%. The purpose of this study was to determine the relationship between patient characteristics and adherence to medication for schizophrenia patients at the Mental Hospital of West Java Province. In this study, cross-sectional descriptive observation was used using concurrent data in the form of primary outpatient data for the period March-May 2022. This study used a purposive sampling technique. Data was collected using a Medication Adherence Rating Scale(MARS) questionnaire. Data analysis was performed univariately and bivariately using the SPSS application with the kormogov-smirnov test. The results obtained stated that schizophrenic patients had a high level of medication adherence as many as 18 people (21%), a moderate level of medication adherence was 66 patients (78%), while a low level of medication adherence was 1 person (1%). The results of the kormogov-smirnov test found that gender with a value of (0.571), age value (0.940), education value value (0.999), occupation value (0.527), and duration of treatment value (1,000). If we look at the results of the analysis, we get a value of > 0.05 which shows that there is no relationship between patient characteristics and adherence to medication for schizophrenia patients at the Mental Hospital of West Java Province.

Keywords: *Schizophrenia, MARS questionnaire, medication adherence*