

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian asfiksia neonatorum Di RSUD dr. Soekardjo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hampir seluruh dari responden usia 20-35 tahun seluruh responden dengan usia kehamilan 36-42 minggu (Matur), setengah dari responden tidak preeklamsia hampir seluruh dari responden dengan paritas tidak beresiko setengah dari responden dengan jenis persalinan spontan hampir seluruh dari responden dengan berat lahir  $>2500$  gram.
2. Ada hubungan usia ibu, paritas, preeklamsia dan BBL dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD dr. Soekardjo.
3. Faktor yang paling berpengaruh adalah paritas, terhadap kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD dr. Soekardjo.

#### **5.2 Saran**

##### **1. Bagi Rumah Sakit**

Hasil Penelitian ini disarankan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi petugas kesehatan di RSUD dr. Soekardjo terutama bagi bidan atau perawat untuk melakukan upaya

##### **2. Bagi Universitas Bhakti Kencana PSDKU Tasikmalaya**

Hasil penelitian ini disarankan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa.

##### **3. Bagi Peneliti**

Sebagai pengalaman baru peneliti dalam melakukan penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti yang akan datang dan kiranya dapat melanjutkan penelitian dengan menggunakan

metode penelitian lainnya, dengan variabel penelitian yang lebih pariatif.