

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat diantaranya :

1. Lebih dari setengah responden memiliki persepsi negatif yaitu 58,1%.
2. Lebih dari setengah responden memiliki lingkungan yang baik yaitu 70,9%.
3. Sebagian besar responden merupakan pasien baru yang sebelumnya belum pernah pengobatan TB Paru yaitu 83,9%.
4. Sebagian besar responden merasakan efek samping ringan sedang yaitu 96,8%.
5. Sebagian besar dari responden mengatakan interaksi tenaga kesehatan memberikan dukungan yaitu 93,5%.
6. Hampir sebagian responden berada pada tingkat ekonomi keluarga sejahtera I yaitu 48,4%.

#### **6.2 Saran**

1. Bagi Puskesmas

Pihak puskesmas diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan pendidikan kesehatan sehingga dapat meningkatkan persepsi positif bagi pasien yang sedang menjalankan pengobatan, menyarankan kepada pasien mengajak ikut serta keluarga atau kerabatnya ketika berobat, upaya

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai TB paru serta puskesmas bisa membuat standar edukasi secara bertahap.

## 2. Bagi perawat

Diharapkan bahwa perawat memegang peranan penting dalam memberikan edukasi secara bertahap kepada masyarakat yang menderita Tuberkulosis Paru. Edukasi tersebut berupa menjelaskan dampak yang mungkin timbul akibat penyebaran penyakit dan untuk pasien TB Paru yang sedang konsumsi obat TB Paru. Edukasi juga meliputi kepatuhan dalam pengobatan TB paru, bahayanya jika pasien TB Paru putus pengobatan.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian intervensi yang bisa meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien TB paru seperti metode pendidikan kesehatan menggunakan media poster ataupun video.