

## ABSTRAK

*Rupture perineum* pada persalinan merupakan robekan pada jalan lahir pada saat melahirkan. Faktor yang bisa menyebabkan *rupture perineum* adalah umur, paritas dan berat badan janin. Fenomena yang terjadi yaitu banyaknya kejadian ruptur yang lebih tinggi di Kabupaten Bandung (22,8%%).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian *rupture perineum* di Puskesmas Pacet Kabupaten Bandung tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu desain penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang kejadian *rupture perineum* pada ibu bersalin. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Sampel didapatkan sebanyak 124 orang dengan pengambilan data secara sekunder yaitu melihat rekam medik Puskesmas Pacet tahun 2018 dengan analisa data menggunakan analisis univariat.

Hasil penelitian bahwa sebagian besar tidak mengalami *rupture perineum*. lebih dari setengahnya pada umur 20-35 tahun. lebih dari setengahnya dengan paritas multipara. dan sebagian besar dengan berat badan janin < 4000 gr.

Simpulan bahwa *rupture perineum* tetap bisa terjadi pada umur 20-35 tahun, paritas multipara dan berat badan janin <4000 gr. Saran kepada pihak puskesmas terus meningkatkan keahlian bagi penolong persalinan untuk mengurangi risiko terjadinya *rupture perineum* dan melakukan rujukan langsung apabila terjadi laserasi derajat III dan IV.

Kata Kunci : Berat Badan Janin, Paritas, Rupture Perineum, Umur.  
Daftar Pustaka : 24 sumber (2010-2016)