

ABSTRAK**Pola Penggunaan Antipsikotik Terhadap Pasien Skizofrenia
di salah satu Klinik Kota Bandung****Oleh:****Teguh Nurakmal Maulana****201FF04018**

Skizofrenia merupakan masalah kejiwaan yang paling rumit dan menantang dari penyakit gangguan jiwa. Penatalaksanaan pengobatan harus segera dilakukan setelah gejala muncul. Terapi utama yang efektif untuk penderita skizofrenia ialah dengan menggunakan antipsikotik. Penelitian ini berupaya untuk mencermati pola penggunaan terapi antipsikotik dan kesesuaian dosis terapi antipsikotik terhadap pasien-pasien skizofrenia di salah satu Klinik Kota Bandung. Jenis penelitian ini merupakan studi observasional yang bersifat deskriptif memanfaatkan data retrospektif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran rekam medik pasien penderita skizofrenia di salah satu Klinik Kota Bandung periode tahun 2021 dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan penyajian tabulasi. Dari total 166 pasien yang memenuhi kriteria inklusi didapatkan hasil penilaian pola penggunaan antipsikotik terhadap pasien skizofrenia yaitu sebanyak 74% pasien menggunakan pola pengobatan kombinasi tipikal-atipikal lebih besar dari pola pengobatan tunggal tipikal dan tunggal atipikal dengan jumlah persentase 26% pasien. Kombinasi obat antipsikotik yang menjadi pilihan terbanyak untuk digunakan sebagai pengobatan skizofrenia ialah kombinasi obat antara haloperidol-trifluoperazin-klozapin sebesar 11% dan antipsikotik tunggal yang banyak terpilih ialah antipsikotik atipikal risperidon sebesar 35%. Untuk Penggunaan obat tambahan selain antipsikotik yang paling banyak digunakan yaitu obat triheksifenidil dengan persentase 41%. Penggunaan obat antipsikotik berdasarkan kesesuaian dosis terapi antipsikotik didapatkan semua antipsikotik mendapatkan persentase sebesar 100%.

Kata Kunci : Skizofrenia, Antipsikotik, Salah satu Klinik Kota Bandung.

ABSTRACT***Pattern of Antipsychotic Use in Schizophrenic Patients
at one of the Bandung City Clinics Bandung***

By:
Teguh Nurakmal Maulana
201FF04018

Schizophrenia is the most complex and challenging mental disorder. Treatment should be started as soon as symptoms appear. The main effective therapy for people with schizophrenia is the use of antipsychotics. This study tried to observe the pattern of use of antipsychotic therapy and the appropriateness of the dose of antipsychotic therapy in schizophrenic patients in one of the Bandung City Clinics. This type of research is a descriptive observational study using retrospective data. Data collection was carried out through tracing the medical records of schizophrenic patients at one of the Bandung City Clinics for the 2021 period and then analyzed quantitatively by presenting tabulations. From a total of 166 patients who met the inclusion criteria, the results of the assessment of the pattern of antipsychotic use in schizophrenic patients were 74% of patients who used the typical-atypical combination treatment pattern which was greater than the single typical treatment pattern, and atypical single treatment with a total percentage of 26% of patients. The most preferred combination of antipsychotic drugs to be used as the treatment of schizophrenia is the combination of haloperidol-trifluoperazine-clozapine at 11% and the single antipsychotic that is widely chosen is the atypical antipsychotic risperidone at 35%. For the use of additional drugs other than antipsychotics, the most widely used was trihexyphenidyl with a percentage of 41%. The use of antipsychotic drugs based on the suitability of the antipsychotic therapy dose obtained all antipsychotics getting a percentage of 100%.

Keywords: Schizophrenia, Antipsychotics, One of Bandung City Clinic