

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari kelima artikel yang relevan dengan tinjauan teori dalam penelitian *literature review* ini Didapatkan bahwa faktor yang dominan yang dapat depresi pada pasien hemodialisa adalah terganggunya psikologis pasien . faktor lainnya juga dipengaruhi oleh tingkat usia, durasi pengobatan, kehilangan pekerjaan dan tingkat pendapatan. sedangkan faktor yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik diantaranya adalah tingkat depresi itu sendiri. Dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Ada hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa.

#### **6.2 Saran**

##### **6.2.1 Saran Bagi Perawat**

Bagi profesi keperawatan diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai bahan dasar masukan dalam meningkatkan asuhan keperawatan dan digunakan untuk informasi tambahan dalam menghadapi masalah dengan topik yang sama yaitu tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa.

### **6.2.2 Saran Bagi Institusi**

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi baru agar bisa melengkapi dari penelitian-penelitian yang terdahulu.

### **6.2.3 Bagi peneliti selanjutnya**

Disarankan untuk meneliti tentang penelitian baru tentang Hubungan Durasi pengobatan terhadap tingkat depresi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa.