

**Program Studi Diploma III Keperawatan
Universitas Bhakti Kencana
Tahun 2020**

ABSTRAK

Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ke dua dari penyakit infeksi tahun 2017 kasus tuberculosis sebanyak 420.994 kasus, dan tahun 2018 Jumlah kasus tuberculosis meningkat menjadi sebanyak 843.000 orang. Sedangkan di dunia 2019 jumlah kasus di Indonesia sebanyak 845.000 orang. Data tuberculosis di Jawa barat yang dilihat dari Profil Kesehatan Indonesia Periode tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus tuberculosis sebanyak 124.000 jiwa. Masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari pathogen yang ditularkan melalui udara (*airborne*), droplet, berbicara, meludah, batuk, atau bersin maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, jumlah sampel yang diambil yaitu 3 jurnal nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan penderita tuberculosis dalam penggunaan masker masih cukup tinggi, hal ini terjadi karena pengetahuan penderita tuberculosis dari segi pencegahan tidak mengetahui pencegahan cara penggunaan masker dengan baik dan benar.

Kata Kunci : pengetahuan, masker, tuberkulosis

Daftar Pustaka : 10 jurnal (2010-2020) 5 website (2010-2020)

Diploma III Nursing Study Program
Bhakti Kencana University
Tahun 2020

ABSTRACT

Tuberculosis is the second cause of death from infectious diseases in 2017 with 420,994 cases of tuberculosis, and in 2018 the number of tuberculosis cases increased to 843,000 people, while in 2019 the number of cases in Indonesia was 845,000. Tuberculosis data in West Java as seen from the Indonesian Health Profile for the 2018 Period shows that there are 124,000 tuberculosis cases. A mask is one of the personal protective equipment used to protect the mouth, nose and face from airborne pathogens, droplets, talking, spitting, coughing, sneezing or splashing infected body fluids. The research method used is a literature study with purposive sampling technique, the number of samples taken is 3 national journals. The results of this study indicate that the lack of knowledge of tuberculosis sufferers in the use of masks is still quite high, this is because the knowledge of tuberculosis sufferers in terms of prevention does not know how to prevent how to use masks properly and correctly.

Keywords : knowledge, masks, tuberculosis

Bibliography : 10 journals (2010-2020) 5 websites (2010-2020)