

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian mengenai Hubungan antara partus lama, induksi oksitosin, dan Anemia dengan kejadian hemoragik post partum Primer di RSUD Soreang Tahun 2018. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar responden tidak mengalami partus lama sebanyak 100 orang (89,3%)
2. Sebagian besar responden tidak mengalami induksi oksitosin sebanyak 94 orang (83,9%)
3. Sebagian besar responden tidak mengalami anemia sebanyak 87 orang (77,7%)
4. Terdapat hubungan antara partus lama dengan hemoragik post partum primer dengan nilai P (0,015)
5. Terdapat hubungan antara Induksi oksitosin dengan hemoragik post partum primer dengan nilai P (0,040)
6. Terdapat hubungan antara anemia dengan hemoragik post partum primer dengan nilai P (0,041)

## **5.2 Saran**

- 1. Bagi Rumah Sakit**

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan mulai dari asuhan kehamilan untuk mencegah anemia dan persalinan dengan induksi oksitosin untuk mencegah hemoragik post partum primer.

- 2. Bagi Institusi Pendidikan**

Diharapkan dapat menambah referensi untuk partus lama, induksi oksitosin, dan Anemia dengan kejadian hemoragik post partum Primer

- 3. Bagi Peneliti**

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain dalam meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang berpengaruh dengan kejadian hemoragik post partum Primer