

ABSTRAK

Salah satu penyebab terjadinya angka kematian bayi diantaranya yaitu kejadian asfiksia. Resiko asfiksia apabila tidak ditangani dengan benar maka salah satu akibat utamanya adalah kematian. Studi pendahuluan didapatkan angka kejadian Asfiksia di RSUD Kota Bandung pada tahun 2018 sebanyak 682 bayi (50,4%).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Kota Bandung tahun 2018

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini adalah gambaran kejadian asfiksia berdasarkan faktor usia kehamilan, paritas dan BBLR. Teknik pengambilan sampel adalah *random sampling*, didapatkan sebanyak 88 orang dengan pengolahan data menggunakan distribusi frekuensi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa bayi baru lahir sebagian besar mengalami asfiksia ringan sebanyak 72 orang (81,8%). Kejadian asfiksia lebih dari setengahnya pada umur kehamilan < 37 minggu sebanyak 45 orang (51,1%), lebih dari setengahnya pada ibu dengan paritas multipara sebanyak 52 orang (51,3%) dan lebih dari setengahnya BBLR sebanyak 48 orang (54,5%).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa paling banyak terjadi asfiksia dikarenakan penyakit penyerta. Disarankan kepada pihak rumah sakit supaya tetap mempertahankan kualitas pelayanan terutama dalam menanggulangi kejadian asfiksia dan peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji lebih lengkap tentang asfiksia

Kata kunci : Asfiksia, usia, paritas, BBLR.

Daftar Pustaka : 20 Sumber, 6 Jurnal (Tahun 2013-2018).

ABSTRACT

One of the causes of infant mortality is the incidence of asphyxia. Risk of asphyxia if not treated properly, one of the main consequences is death. The preliminary study found the incidence of Asphyxia in Bandung City Public Hospital in 2018 as many as 682 infants (50.4%).

The purpose of this study was to describe the factors that influence the incidence of asphyxia in newborns in Bandung City Hospital in 2018

This research is a descriptive research that is research that describes a phenomenon in this case is a description of the incidence of asphyxia based on factors of gestational age, parity and low birth weight. The sampling technique is random sampling, obtained as many as 88 people by processing data using frequency distribution.

The results showed that most newborns had mild asphyxia as many as 72 people (81.8%). More than half of the incidence of asphyxia at <37 weeks gestational age were 45 people (51.1%), more than half of them were women with multiparous parity of 52 people (51.3%) and more than half of LBW as many as 48 people (54.5%).

From the results of this study it can be concluded that the greatest incidence of asphyxia is due to comorbidities. It is recommended to the hospital to maintain the quality of service, especially in overcoming the incidence of asphyxia and further researchers are expected to be able to study more fully about asphyxia.

Keywords : **Asphyxia, age, parity, LBW.**

Bibliography : **20 Sources, 6 Journals (2013-2018).**