

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan studi literatur dan menganalisisnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan ibu hamil sebagai perokok pasif dengan berat bayi lahir rendah (BBLR). Dari ketiga jurnal yang telah dianalisa bahwa masih banyaknya ibu yang terpapar asap rokok selama kehamilannya di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya, pada kelompok subyek ibu hamil yang bersuamikan perokok aktif didapatkan kejadian BBLR yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada kelompok subyek ibu hamil yang suaminya tidak merokok, dan diketahui bahwa ibu yang terpapar asap rokok selama kehamilan lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak terpapar asap rokok selama kehamilan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Akademik

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan tambahan diperpustakaan untuk referensi sebagai bahan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan literatur terkait untuk memperdalam tentang hubungan ibu hamil sebagai perokok pasif dengan berat bayi lahir rendah (BBLR).

5.2.3 Bagi Praktik Keperawatan

Dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu program pengendalian atau pencegahan pada kejadian berat bayi lahir rendah (BBLR) melalui upaya untuk mencegah semakin banyak ibu hamil sebagai perokok pasif dengan menciptakan rumah dan lingkungan sekitarnya tanpa asap rokok.