

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Faktor Resiko *stunting* Pada Balita 1-5 tahun” dapat disimpulkan bahwa Faktor Resiko *Stunting* yang di dapat adalah Nutrisi pada Prenatal tidak adekuat, Pemberian ASI yang tidak diberikan karena ASI tidak keluar, Pemberian MPASI yang jenis nya hanya diberikan dengan jenis MPASI yang sama yaitu MPASI instan, Riwayat Penyakit yaitu balita yang mengalami demam, batuk, pilek dan diare dan Riwayat Imunisasi yang tidak lengkap.

6.2 Saran

6.2.1 Penulis

Penulis dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi ini kepada ibu yang memiliki balita, agar bisa mengcegah dan mengurangi penderita *stunting* .

6.2.2 Peneliti selanjutnya

Peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis penelitian yang serupa sehingga memperkaya referensi penelitian yang ada. Peneliti lain juga disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain seperti : Usia, Pengetahuan, keyakinan, tingkat ekonomi, pendidikan, pengalaman, iklan, tempat tinggal, lingkungan sosial, dan kebudayaan.