

ABSTRAK

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak (pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak yang sama dengan usianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Penyebab terjadinya stunting pada anak yaitu faktor keluarga dan rumah tangga, makanan tambahan dan pola pemberian makan, menyusui, infeksi penyakit penyerta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan Hubungan Pola Pemberian Makan dan penyakit penyerta dengan kejadian stunting anak usia toddler di wilayah kerja Puskesmas Pagaden.

Jenis penelitian kuantitatif korelatif dengan desain *cross sectional*. Populasi berjumlah 389 teknik pengambilan sampel yaitu *Accidental Sampling* sebanyak 80 orang tua yang memiliki anak usia toddler. Instrumen yang digunakan lembar kuesioner pola pemberian makan kuesioner *Child Feeding Questionnaire* (CFQ) dan kuesioner penyakit penyerta. Analisa yang digunakan univariat dan bivariat dengan uji *chi square*.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pola pemberian makan dengan kejadian stunting anak usia toddler ($P\text{-value } 0,006 < 0,05$) Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar (73,3%) orang tua menerapkan pola pemberian anak tidak tepat mengalami stunting, Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar (72,0%) anak yang memiliki riwayat penyakit penyerta mengalami stunting. Pola pemberian pada anak sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan anak sehingga diharuskan pihak puskesmas dapat memberikan penkes mengenai pentingnya pola pemberian makan yang baik dan benar untuk anak.

Kata Kunci :Penyakit Penyerta, Pola pemberian makan, Stunting

Daftar Pustaka Books	: 5 Buku (2013-2021)
Journals	: 26 Jurnal (2010-2021)
Web	: 4 Web (2017-2021)

ABSTRACT

Stunting is a condition of failure to grow in children (body growth and brain development) due to malnutrition for a long time, so that children are shorter than children of the same age and have delays in thinking. The causes of stunting in children are family and household factors, additional food and feeding patterns, breastfeeding, infection with comorbidities.

This type of quantitative research is correlative with a cross sectional design. The population is 389 sampling techniques, namely Accidental Sampling as many as 80 parents who have toddler age children. The instrument used was a questionnaire on feeding patterns, a Child Feeding Questionnaire (CFQ) and a questionnaire for comorbidities. The analysis used univariate and bivariate with chi square test.

The results showed that there was a relationship between feeding patterns and the incidence of stunting in toddlers ($P\text{-value } 0.006 < 0.05$). Majority (73.3%) of parents apply the inappropriate pattern of giving children experiencing stunting. The pattern of giving to children plays an important role in the child's growth process so it is required that the puskesmas can provide health education about the importance of good and correct feeding patterns for children.

Keywords: comorbidities, feeding patterns, stunting

Bibliography Books : 5 Books (2013-2021)

Journals : 26 Journals (2010-2021)

Web : 4 Web (2017-2021)