

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ATRIAL FIBRILASI
DENGAN PENURUNAN CURAH JANTUNG
DI RUANG CEMPAKA RSUD**

**FEBRIANSYAH NUGRAHA
221FK01023**

Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Keperawatan
Universitas Bhakti kencana

ABSTRAK

Latar Belakang: Atrial Fibrilasi merupakan jenis aritmia yang paling sering dijumpai dan dapat menyebabkan penurunan curah jantung, Kondisi ini terjadi akibat aktivitas listrik yang tidak terkoordinasi pada atrium jantung, sehingga Masalah utama yang akan muncul pada pasien atrial fibrilasi adalah penurunan curah jantung, hal ini menyebabkan denyut jantung yang tidak teratur dan tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. **Tujuan Penelitian** untuk Menggambarkan asuhan keperawatan pada pasien Atrial Fibrilasi dengan Penurunan Curah Jantung di Ruang Cempaka Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. **Metode:** metode penulisan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu untuk mengeksplorasi suatu masalah atau fenomena dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi kasus ini dilakukan pada dua pasien Atrial Fibrilasi dengan masalah keperawatan penurunan curah jantung. **Hasil:** setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan memberikan intervensi perawatan jantung dan terapi murotal selama 3x24 jam, masalah keperawatan penurunan curah jantung pada pasien 1 dan 2 teratasi dihari ke tiga. **Diskusi:** pasien dengan penurunan curah jantung setelah dilakukan intervensi Terapi murotal selama 3x24 jam dengan durasi 1 jam didapatkan palpitasi menurun, takikardi menurun dan kecemasan terhadap penyakit yang mengancam menurun.

Kata kunci: Asuhan Keperawatan, Penurunan curah jantung, Atrial fibrilasi

***NURSING CARE IN ATRIAL FIBRILLATION PATIENTS WITH A
DECREASE IN CARDIAC OUTPUT IN THE CEMPAKA
ROOM OF MAJALAYA REGIONAL HOSPITAL***

FEBRIANSYAH NUGRAHA

221FK01023

DIII Nursing Study Program, Faculty of Nursing

Bhakti Kencana University

ABSTRACT

Background: Atrial Fibrillation is the most common type of arrhythmia and can cause decreased cardiac output. This condition occurs due to uncoordinated electrical activity in the atria of the heart, so that the main problem that will arise in atrial fibrillation patients is decreased cardiac output, this causes an irregular heartbeat and cannot pump blood throughout the body optimally. The purpose of the study was to describe nursing care for Atrial Fibrillation patients with Decreased Cardiac Output in the Cempaka Room, Majalaya Regional General Hospital. **Method:** the writing method is descriptive with a case study approach, namely to explore a problem or phenomenon with detailed limitations, have in-depth data collection and include various sources of information. This case study was conducted on two Atrial Fibrillation patients with nursing problems of decreased cardiac output. **Results:** after nursing care was carried out by providing cardiac care interventions and murtal therapy for 3x24 hours, the nursing problem of decreased cardiac output in patients 1 and 2 was resolved on the third day. **Discussion:** Patients with decreased cardiac output after undergoing Murtal therapy intervention for 3x24 hours with a duration of 1 hour experienced decreased palpitations, decreased tachycardia and decreased anxiety about threatening diseases..

Keywords: Nursing care, Decreased cardiac output, Atrial fibrilasi