

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ke lima jurnal mengenai hubungan antara preeklampsia dengan kejadian BBLR didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara preeklamsi dan kejadian BBLR. Ibu hamil dengan preeklampsia kemungkinan berisiko 12,69 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil yang tidak preeklampsia setelah dikontrol variabel pendidikan, riwayat abortus dan paritas, saat preeklampsia terjadi Vasospasme menyebabkan terjadinya konstiksi vaskular pada berbagai organ termasuk plasenta. Resistensi aliran darah karena konstiksi vaskular akan menyebabkan hipertensi arterial pada plasenta. Menurunnya aliran darah ke plasenta menyebabkan gangguan fungsi plasenta sehingga terjadi gangguan pertumbuhan janin.

6.2 Saran

1) Bagi Universitas Bhakti Kencana Bandung

Hasil *literature review* ini dapat menambah referensi mengenai hubungan antara preeklampsia dengan kejadian BBLR

2) Bagi Keperawatan

Hasil *literature review* ini dapat membangun kerangka konseptual tentang hubungan antara preeklampsia dengan kejadian BBLR dan menambah keilmuan profesi Keperawatan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian *literature review* dapat dijadikan data dasar untuk penelitian.