

ABSTRAK

Angka kematian balita AKABA 2019 Saat ini, angka kelahiran hidup mencapai 24 per 1000, namun tujuan pada tahun 2024 adalah menurunkannya menjadi 16 per 1000. Meski demikian, penting untuk menjaga agar program imunisasi tetap berjalan seperti biasa dan tidak kurang penting dibandingkan dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebab, imunisasi merupakan layanan dasar dan utama dalam kesehatan. Sayangnya, ini menyebabkan cakupan imunisasi pada balita menjadi semakin terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan imunisasi dasar selama pandemi Covid-19 di desa Cibeet. Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel dalam studi ini adalah total sampling dengan jumlah 138 balita. Data yang dikumpulkan dianalisis secara dekskriptif dan statistic dengan menggunakan analisis univariat dan Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat buku KIA.

Di desa cibeet menunjukan bahwa kelengkapan imunisasi dasar balita 2-3 tahun berdasarkan jenis imunisasi Hepatitis B lebih dari setengahnya lengkap (71,01%), jenis imunisasi BCG lebih dari setengahnya lengkap (63,77%), jenis imunisasi Polio kurang dari setengahnya tidak lengkap (43,48%), jenis imunisasi DPT-HB-HIB kurang dari setengahnya tidak lengkap (49,27%) dan jenis imunisasi Campak lebih dari setengahnya tidak imunisasi (69,58%).

Kata Kunci : Balita, Covid-19, Imunisasi

ABSTRACT

AKABA 2019 under-five mortality rate Currently, the live birth rate has reached 24 per 1000, but the goal by 2024 is to reduce it to 16 per 1000. However, it is important to keep the immunization program running as usual and is no less important than prevention and handling Covid-19. Because immunization is a basic and primary health service. Unfortunately, this causes immunization coverage for toddlers to become increasingly limited. This research aims to understand how basic immunization was implemented during the Covid-19 pandemic in Cibeet village.

This research is a quantitative descriptive type of research. The method used to take samples in this study was total sampling with a total of 138 toddlers. The data collected was analyzed descriptively and statistically using univariate analysis and the data collection process in this research was carried out by looking at the KIA book.

In Cibeet village, it shows that the completeness of basic immunization for toddlers aged 2-3 years based on the Hepatitis B immunization type is more than half complete (71.01%), the BCG immunization type is more than half complete (63.77%), the Polio immunization type is less than half incomplete. complete (43.48%), less than half of the DPT-HB-HIB immunization type was incomplete (49.27%) and more than half of the Measles immunization type was not immunized (69.58%).

Keywords: Toddlers, Covid-19, Immunization