

ABSTRAK

GAMBARAN KEJADIAN *POST OPERATIVE NAUSEA AND VOMITING* PADA PASIEN PEROKOK AKTIF DENGAN ANESTESI UMUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA

DINDA AZZAHRA

201FI03066

Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Bhakti Kencana

Post Operative Nausea and Vomiting (PONV) merupakan kejadian yang sering terjadi pada pasca operasi dengan anestesi umum yang mempengaruhi waktu pemulihan pasien dan meningkatkan beban perawatan kesehatan. Pasien perokok aktif memiliki risiko yang berbeda dalam mengalami kejadian PONV dibandingkan dengan pasien non perokok. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kejadian PONV pada pasien perokok aktif dengan anestesi umum di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis deskriptif statistik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 201 responden dengan total sampel 51 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *consecutive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian PONV pada pasien perokok aktif hanya ditemukan 9 pasien dari 51 pasien perokok aktif dengan karakteristik responden berdasarkan faktor penyebab PONV seperti jenis anestesi umum, usia, jenis kelamin, lama operasi, lama puasa, dan status fisik ASA. Kesimpulan dari penelitian ini sebagian besar pasien perokok aktif yang mengalami PONV menggunakan jenis anestesi umum GA ETT dan status fisik ASA I

Kata Kunci : Anestesi umum, perokok aktif, PONV.

ABSTRACT

DESCRIPTION OF THE INCIDENT OF POST OPERATIVE NAUSEA AND VOMITING IN ACTIVE SMOKING PATIENTS WITH GENERAL ANESTHESIA AT THE BAYU ASIH REGIONAL GENERAL HOSPITAL, PURWAKARTA DISTRICT

DINDA AZZAHRA

201FI03066

Bachelor of Applied Anesthesiology Nursing Study Program,

Faculty of Health Sciences

Bhakti Kencana University

Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) is a frequent occurrence in postoperative with general anesthesia that affects patient recovery time and increases the burden of health care. Active smoking patients have a different risk of experiencing PONV compared to non-smoking patients. The purpose of this study was to determine the incidence of PONV in active smoker patients under general anesthesia at RSUD Bayu Asih Purwakarta Regency. This study used a quantitative method of descriptive statistics. The population in this study amounted to 201 respondents with a total sample of 51 respondents. The sampling technique used in this study was consecutive sampling. The results showed that the incidence of PONV in active smoking patients was only found in 9 patients out of 51 active smoking patients with the characteristics of respondents based on factors causing PONV such as type of general anesthesia, age, gender, length of surgery, length of fasting, and ASA physical status. The conclusion of this study is that most active smoker patients who experience PONV use the type of general anesthesia GA ETT and physical status ASA I.

Keywords: Active smoking patients, general anesthesia, PONV.